

ACC Classic 20mg/ml syrop 100 ml

cena: 15,94 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe, oskrzela
Działanie	wykrztuśne
Opakowanie	100 ml
Postać	roztwór
Producent	SANDOZ GMBH
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Acetylcysteinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	kaszel, kaszel mokry

Opis produktu

Opis

ACC classic zawiera acetylocysteinę, która zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia jej odkrztuszenie. Smak wiśniowy.

Skład:

Substancją czynną leku jest acetylocysteina.

1 ml roztworu doustnego zawiera 20 mg acetylocysteiny.

Substancje pomocnicze: karmeloza sodowa, metylu parahydroksybenzoesan (E218), sodu benzoesan (E211), sodu edetynian, sodu wodorotlenek (10% roztwór wodny), sacharyna sodowa, woda oczyszczona, aromat wiśniowy

Wskazania:

Lek ACC classic stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podawać doustnie stosując dołączoną do opakowania strzykawkę miarową (pojemności 5 ml) lub miarką (pojemności 10 ml).
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml roztworu dwa lub trzy razy na dobę (200 mg do 300 mg acetylocysteiny na dobę w dawkach podzielnych)

Dzieci w wieku od 7 do 14 lat: 10 ml roztworu dwa razy na dobę (400 mg acetylocysteiny na dobę)

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 10 ml roztworu dwa lub trzy razy na dobę (400 mg do 600 mg acetylocysteiny na dobę w

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku ACC classic:

Jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę, metylu parahydroksybenzoesan lub na którykolwiek z pozostałych składników leku ACC classic,

Jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy,

Jeśli pacjent ma ostry stan astmatyczny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku występowania (obecnie lub w przeszłości):

astmy,

niewydolności oddechowej,

choroby wrzodowej,

problemów z odkrztuszaniem,

należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Po pierwszym otwarciu butelki ACC classic można przechowywać w temperaturze poniżej 25°C nie dłużej niż 11 dni.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku ACC classic w z lekami przeciwkaszlowymi.

Lek może nasilić działanie nitrogliceryny i innych azotanów.

Lek może osłabiać działanie niektórych antybiotyków. Należy go przyjmować 2h po zażyciu antybiotyku.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićm:

Lek należy przyjmować po posiłku.

Podczas stosowania leku należy spożywać co najmniej 1,5 l płynów.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek ACC classic można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.