

Actifed syrop 100 ml



cena: 26,03 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe, nos, zatoki
Działanie	przeciwkaszlowe, udrażniające nos
Opakowanie	100 ml
Postać	syrop
Producent	MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LTD.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Tripolidinum, Pseudoephedrinum, Dextromethorphanum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	kaszel, kaszel suchy, katar, przeziębienie

Opis produktu

Opis:

Actifed zawiera 3 substancje czynne, o uzupełniającym się działaniu. Jedna z nich, z grupy leków przeciwalergicznych (triprolidyna) - zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa, wyciek z nosa, świąd i kichanie. Pseudoefedryna z kolei zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa, a dekstrometorfan działa hamująco na ośrodek kaszlu i wykazuje działanie przeciwkaszlowe. Lek ten łagodzi objawy takie jak katar i kaszel, łagodzi objawy towarzyszące stanom zapalnym górnych dróg oddechowych.

Skład:

Substancjami czynnymi są: triprolidyna (Triprolidini hydrochloridum), pseudoefedryna (Pseudoephedrini hydrochloridum), dekstrometorfan (Dextromethorphanii hydrobromidum).

5 ml syropu zawiera 1,25 mg triprolidyny chlorowodoru, 30 mg pseudoefedryny chlorowodoru, 10 mg dekstrometorfanu bromowodoru.

Substancje pomocnicze: sorbitol roztwór 70%, sacharoza, sodu benzoesan, metylu hydroksybenzoesan, czerwień koszenilowa, etanol 96%, zapach jeżynowy, lewomentol, wanilina, woda oczyszczona.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się doustnie. Dawkowanie syropu zależy od wieku pacjenta.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Actifed:

w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku istniejące nadciśnienia, ciężkiej choroby wieńcowej,
jeśli w ostatnim czasie (14 dni) pacjent przyjmował inhibitory MAO lub je przyjmuje,

w przypadku stosowania furazolidonu,
jeśli pacjent cierpi na ciężką niewydolność wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku chorób serca, nadciśnienia tętniczego, chorób tarczycy, cukrzycy, jaskry, zaburzonej czynności wątroby i/lub nerek, jeśli pacjent ma przewlekły kaszel taki jak w przebiegu astmy lub kaszel z dużą ilością wydzieliny.

Leku nie stosować łącznie z alkoholem.

Lek może powodować senność.

Istnieje możliwość wystąpienia uzależnienia od leku - ze względu na dekstrometorfan.

Lek zawiera małe ilości etanolu.

Lek zawiera sorbitol - nie stosować w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.

Lek zawiera metylu hydroksybenzoesan i czerwień koszenilową - składniki, które mogą powodować reakcje alergiczne (także typu późnego).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Actifed może wchodzić w interakcje z:

inhibitorami MAO,

furazolidonem,

TLPD,

lekami hamującymi łaknienie,

lekami psychotropowymi,

lekami obniżającymi ciśnienie,

lekami uspokajającymi i nasennymi,

inhibitorami enzymu CYP2D6 jak fluoksetyna, paroksetyna, sertralina, bupropion, propafenon, haloperidol.

Ciąża i karmienie piersią:

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Stosowanie leku u dzieci poniżej 7 lat jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Podczas stosowania tego leku nie należy prowadzić samochodu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.