

Alantan 2% maść 30 g

cena: 7,43 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	skóra
Działanie	nawilżające, osłaniające, wspomagające, złuszczone
Opakowanie	30 g
Postać	maść
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Sposób aplikacji	na skórę
Substancja czynna/dawka	Allantoinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, oparzenia, rana, rogowacenie, stan zapalny

Opis produktu

Opis:

Alantan ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę.

Lek zawiera substancję czynną allantoinę, która działa złuszczone oraz osłaniające na skórę. Allantoina poprawia nawilżenie skóry oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzanie wzrostu nowej tkanki. Allantoina stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka).

Skład:

1 g maści zawiera 20 mg allantoiny.

Pozostałe substancje to: lanolina (tłuszcz wełny), parafina ciekła, wazelina biała, etylparahydroksybenzoesan (E 214), glikol propylenowy (E 1520), woda oczyszczona.

Wskazania:

- leczenie trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych),
- leczenie przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczeniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry),
- leczenie płytkich owrzodzeń, ubytków skóry i błon śluzowych.

Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu leczniczego:

- w nadwrażliwości na alantoinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- do oczu,
- na zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Lek należy delikatnie nakładać na zmienione chorobowo miejsca 2 do 3 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Niewielką ilość maści można nałożyć na jałowy kompres i przyłożyć na oczyszczoną ranę. Opatrunek należy zmieniać raz do dwóch razy na dobę.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.