

Ambrosol TEVA 15mg syrop 120 ml

cena: 11,61 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe
Działanie	wykrztuśne
Opakowanie	120 ml
Postać	syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Ambroxolum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	kaszel, kaszel mokry

Opis produktu

Opis:

Ambrosol Teva to syrop na mokry kaszel. Substancja czynna leku Ambrosol działa wykrztuśnie i mukolitycznie. Zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych, zmniejsza jego lepkość, przyspiesza transport wydzieliny w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Skład:

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek (Ambroxoli hydrochloridum).

5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodoru.

Substancje pomocnicze: sorbitol płynny 70% (E420), glicerol (E422), kwas cytrynowy jednowodny (E330), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowane dawki leku Ambrosol:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Początkowo, przez 2 do 3 dni należy stosować 10 ml syropu (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę; następnie dawkę należy zmniejszyć do 10 ml syropu 2 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: 2,5 ml syropu (1/2 łyżki miarowej) 3 razy na dobę.

Nie stosować u dzieci bez porozumienia z lekarzem.

Lek należy zażywać doustnie, po posiłku.

Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem.

Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 7 do 14 dni, dawkę należy zmniejszyć.
Jeśli objawy nasila się lub nie ustępują po 4 do 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksol, bromohexynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ambrosol Teva.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosować ostrożnie u osób z chorobą wrzodową.
Stosować ostrożnie u osób z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli, ze względu na możliwość zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.
Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i propylu oraz glikolu propylenowego, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Lek Ambrosol Teva może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić od światła.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.
Ambroksolu nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, np. kodeiną lub lekami hamującymi wydzielanie śluzu.
Ambroksol zwiększa przenikanie niektórych antybiotyków (np. amoksycyliny, cefuroksymu, erytromycyny, doksycykliny) do mięszu płucnego.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

Lek należy przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Substancja czynna leku Ambroksol przenika do przez barierę łożyskową oraz do mleka matki karmiącej. Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.