

BOBOLEN Baby Syrop na suchy kaszel 115ml

cena: 10,79 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe, gardło
Działanie	łagodzące, wspomagające
Opakowanie	115 ml
Postać	syrop
Producent	POLSKI LEK
Sposób aplikacji	doustnie
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	kaszel, kaszel suchy, podrażnienie, suchość

Opis produktu

Opis:

Bobolen baby syrop na suchy kaszel przeznaczony jest do łagodzenia suchego kaszlu przy niezżytach dróg oddechowych oraz podrażnieniach błon śluzowych jamy ustnej i gardła.

Bobolen® baby syrop na suchy kaszel przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia i dorosłych. Dzieciom poniżej 1 roku życia syrop można podawać tylko po konsultacji z lekarzem. W skład syropu wchodzi glicerol oraz ekstrakt z prawoślazu zawierający substancje śluzowe, które działają powlekająco i osłaniająco na błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Bez dodatku: cukru, barwników, aromatów. Produkt nie zawiera etanolu.

Skład:

glicerol, ekstrakt z korzenia prawoślazu DER 3-4:1 (0,55% m/m).
Pozostałe składniki: syrop maltitolowy, sok jabłkowy, woda oczyszczona, benzoosan sodu.

Sposób użycia:

Dołączona do produktu pipeta umożliwia precyzyjne odmierzanie zalecanej porcji.

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy: 1-2 ml – 4 razy w ciągu doby

Dzieci od 1 roku do 3 lat: 3 ml – 4 razy w ciągu doby

Dzieci od 3 roku do 6 lat: 4 ml – 4 razy w ciągu doby

Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml – 5 razy w ciągu doby

Od 12 lat i dorośli: 10 ml 3-6 razy w ciągu doby

Zastosowanie zbyt dużych ilości może mieć efekt przeczyszczający. Nie stosować w przypadku stwierdzonego uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w przypadku zespołu złego wchłaniania fruktozy lub wrodzonej nietolerancji fruktozy (fruktozemia) ze względu na obecność syropu maltitolowego. Nie stosować po upływie terminu ważności.



Stosować zgodnie z instrukcją użycia. Nie używać jeśli uszkodzone jest opakowanie bezpośrednie. Nie używać z innymi preparatami podawanymi doustnie.

Produkt może być w razie potrzeby stosowany przez dłuższy czas. Jednak w przypadku braku poprawy bądź nasileniu objawów po 3 dniach stosowania należy zasięgnąć porady lekarza.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

* Posiada deklarację zgodności UE

* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.