


Bronchosol syrop 100 ml



cena: 11,83 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe
Działanie	wykrztuśne
Opakowanie	100 ml
Postać	syrop
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Herbal praeparatio
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	kaszel

Opis produktu

Opis:

Syrop Bronchosol jest lekiem roślinnym stosowanym tradycyjnie i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.

Tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

Bronchosol jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 4 lat.

Skład:

1 ml syropu zawiera: 43,6 mg wyciągu gęstego złożonego (3:1) z: ziela tymianku *Thymus vulgaris* (L) (*Thymus zygis* (L)) i korzenia pierwiosnka *Primula veris* (L) (*Primula elatior* (L)) (7,6/1), (Extractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae radice), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oraz 0,198 mg tymolu (*Thymolum*).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, etanol.

1 ml syropu zawiera do 845 mg sacharozy.

Produkt zawiera nie więcej niż 0,5% (m/m) etanolu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku:

w przypadku nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu,

w przypadku nadwrażliwości na rośliny z rodziny jasnotowatych (*Lamiaceae*) zwanych też wargowymi (*Labiatae*),

u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (*acute obstructive laryngitis*), również w przeszłości, w astmie.

Jeśli objawy nasilają się, nie ustępują po 7 dniach, wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy skonsultować się z lekarzem.



Forvital Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenie dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.