

## Carbo medicinalis 0,3g 20 tabletek

cena: 14,97 pln



### Opis słownikowy

Cześć ciała	jelita
Opakowanie	20 sztuk
Postać	tabletki
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Carbo medicinalis
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	biegunka, niestrawność, wzdęcia, zatrucie pokarmowe

### Opis produktu

#### Opis:

Carbo Medicinalis VP to lek zawierający węgiel aktywny, charakteryzujący się dużymi właściwościami adsorpcyjnymi i z tego powodu podaje się go w biegunkach, wzdęciach czy niestrawności. Produkt leczniczy przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

#### Skład:

Substancją czynną leku jest węgiel aktywny.

1 tabletkę zawiera 300 mg węgla aktywnego.

Substancje pomocnicze: sacharoza, celuloza mikrokryształiczna, żelatyna, karboksymetyloskrobia sodowa, glicerol, magnezu stearynian.

#### Dawkowanie:

Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Carbo medicinalis VP stosuje się doustnie. Dawkowanie leku zależy od wskazania leczniczego.

W przypadku biegunek u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat podaje się jednorazowo doustnie około 4,0g (10-13 tabletek) najlepiej w postaci przygotowanej z rozkruszonych tabletek wodnej papki. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli konieczne.

Przy wzdęciach i niestrawności stosuje się zwykle 3-4 tabletki kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Tabletki można połykać w całości jednak w celu ich szybszego działania zalecane jest ich rozgryzanie.

Jeśli pomimo leczenia wzdęcia utrzymują się 7 dni a biegunka 2 dni, lub jeśli wystąpi gorączka lub krew w stolcu, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ może to wskazywać, że leczenie wyłącznie węglem aktywnym jest niewystarczające.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym, ponieważ ciężka i długotrwała biegunka może prowadzić do zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Carbomedialis VP zawiera sacharozę (253,5 mg w 1 tablecie), więc należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą, jak również w przypadku osób z nietolerancją niektórych cukrów, którzy powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.  
Nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami, gdyż może osłabić ich działanie.  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.  
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.