

# Chlorchinaldin smak czarnej porzeczki, 20 tabletek do ssania

cena: 14,45 pln



## Opis słownikowy

Cześć ciała	gardło, jama ustna
Działanie	przeciwbakteryjne, przeciwbólowe, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne
Opakowanie	20 sztuk
Postać	tabletki
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Chlorquinaldolum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	ból, pieczenie, pleśniawki, stan zapalny

## Opis produktu

### Opis

Chlorchinaldin to produkt leczniczy w postaci tabletek do ssania stosowany w zakażeniach bakteryjnych i grzybiczych dziąseł, jamy ustnej i gardła. Smak czarna porzeczka.

### Skład

Substancją czynną leku jest: chlorochinaldol.

Jedna tabletki zawiera 2 mg chlorochinaldolu.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, karmeloza sodowa, talk, aromat czarnej porzeczki, magnezu stearynian.

### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

Co 1 - 2 godziny ssać 1 tabletkę.

Nie należy stosować większej dawki niż 10 tabletek do ssania na dobę.

Nie należy rozgryzać tabletek.

Nie stosować podczas posiłków.

Nie należy stosować leku przez długi okres.

### Działanie

Chlorchinaldin to lek o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniakowym.

#### Wskazania

Lek Chlorchinaldin jest wskazany do stosowania miejscowego:  
w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł,  
w pleśniawkach,  
w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin:  
w przypadku uczulenia na chlorochinaldol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

#### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

podrażnienie błony śluzowej, świąd, objawy alergiczne,  
objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób nadwrażliwych.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku przez kilka dni, należy zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie.

W zakażeniach bakteryjnych często konieczne jest zastosowanie odpowiedniego antybiotyku o działaniu ogólnoustrojowym, a Chlorchinaldin stosuje się pomocniczo.

Chlorchinaldin zawiera w swoim składzie sacharozę - niektórzy pacjenci wykazują nietolerancję pewnych cukrów.

Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

Lek należy przechowywać w temperaturze niższej niż 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Chlorchinaldin może wchodzić w interakcje z:

Związkami metali i jodu (osłabienie działania leku Chlorchinaldin).

#### Stosowanie leku z jedzeniem i pićciem

Leku nie należy stosować podczas posiłków.

#### Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Chlorchinaldin w okresie ciąży i karmienia piersią.

#### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Chlorchinaldin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

#### Producent

PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA

Jankovcova 1569/2c

Praga, Republika Czeska

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.