

## Cholinex 32 pastylki do ssania

cena: 20,66 pln



### Opis słownikowy

Cześć ciała	gardło, jama ustna
Działanie	przeciwbólowe, przeciwzapalne
Opakowanie	32 sztuki
Postać	pastylki
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Cholini salicylas
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	ból, obrzęk, stan zapalny

### Opis produktu

#### Opis:

Cholinex to produkt leczniczy do stosowania m.in. w stanach zapalnych błony śluzowej gardła, bólu i obrzęku gardła. Cholinex wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Salicylan choliny zmniejsza obrzęk, przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Zwiększa również wydzielanie śliny, co wspomaga działanie przeciwzapalne.

#### Wskazania:

stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła,  
ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym,  
jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

#### Skład:

Substancją czynną jest: salicylan choliny (Cholini salicylas).  
1 pastylka zawiera 150 mg salicylanu choliny.  
Substancje pomocnicze: sacharoza, glukoza ciekła, olejek miętowy.

#### Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania w jamie ustnej.  
Maksymalnie 6 pastylek na dobę.  
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 pastylkę ssać od 4 do 6 razy na dobę.

Jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1 do 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

**Przeciwwskazania:**

Kiedy nie stosować leku Cholinex:

w przypadku uczulenia na substancję czynną, salicylany, inne NLPZ lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli pacjent ma żylaki przełyku (ryzyko krwotoku).

**Działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

reakcje alergiczne (zaczernienie skóry, wysypka, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu, trudności w oddychaniu),

uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (ból brzucha, wymioty, krwawienia).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

zespół Rey'a u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Zastosowanie leku skonsultować z lekarzem w przypadku: stanów zapalnych przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, astmy oskrzelowej.

Lek zawiera glukozę - stosować ostrożnie u osób ze skłonnością do próchnicy.

Lek zawiera sacharozę.

Przechowywać w sposób niedostępny i niewidoczny dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

Cholinex może wchodzić w interakcje z:

innymi lekami NLPZ (osłabienie ich działania),

lekami uspokajającymi, nasennymi, przeciwcukrzycowymi, przeciwzakrzepowymi,

steroidowymi lekami przeciwzapalnymi,

lekami przeciwzakrzepowymi,

fibrynolitycznymi,

lekami hamującymi agregację płytek.

**Stosowanie leku z jedzeniem i pić:**

Stosować niezależnie od posiłków.

**Ciąża i karmienie piersią:**

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

**Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:**

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat bez konsultacji z lekarzem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.