

Clarvox Syrop na kaszel i ból gardła 200 ml

cena: 20,01 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe, gardło
Działanie	łagodzące, nawilżające, ochronne, wspomagające
Opakowanie	200 ml
Postać	syrop
Producent	RADA SP. Z O.O. SP.J.
Sposób aplikacji	doustnie
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	ból, chrypka, infekcja, kaszel suchy, podrażnienie, suchość

Opis produktu

Opis:

CLARVOX Syrop na kaszel i ból gardła łagodzi objawy suchego kaszlu, chrypki, a także uczucie suchości, pieczenia i bólu gardła. Zawarty w produkcie wyciąg z porostu islandzkiego zawiera liczne substancje śluzowe tworzące powłokę ochronną, która ogranicza podatność na zewnętrzne czynniki drażniące. Zawartość substancji powlekającej ułatwia przełykanie i ogranicza odruch kaszlu.

CLARVOX Syrop na kaszel i ból gardła może być stosowany jako środek pomocniczy podczas infekcji bakteryjnych i wirusowych (np. przeziębienie, angina), a także po przebytych chorobach w celu łagodzenia podrażnień błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

CLARVOX Syrop na kaszel i ból gardła zalecany jest osobom:

odczuwającym objawy suchego, drażniącego kaszlu,

podrażnienie, ból gardła,

którym towarzyszy uczucie bólu i pieczenia podczas przełykania,

odczuwającym uczucie suchości jamy ustnej i gardła spowodowane czynnikami zewnętrznymi (m.in. przebywaniem w

pomieszczeniach niewietrzonych, silnie ogrzewanych lub klimatyzowanych),

odczuwającym objawy chrypki, która może pojawiać się m.in. w wyniku nadwyżęzania strun głosowych.

Składniki:

wyciąg z plechy porostu islandzkiego (*Cetraria islandica* L. Acharius), woda, sacharoza, glicerol, benzoosan sodu, guma ksantanowa, kwas cytrynowy, naturalny aromat truskawkowy.

Sposób użycia:

Wyrób medyczny jest przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 1. roku życia.

Produkt może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią po konsultacji z lekarzem.

W celu odmierzenia odpowiedniej dawki syropu należy posługiwać się kieliszkiem miarowym dołączonym do opakowania.

W przypadku małych dzieci produkt podaje osoba dorosła.

Dzieci w wieku od 1 do 6 lat: 5 ml syropu 1-2 razy dziennie, w zależności od potrzeby.

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat: 5 ml syropu 3-4 razy dziennie, w zależności od potrzeby.

Dorośli: 10 ml syropu 3-4 razy dziennie, w zależności od potrzeby.

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć butelką. Przez około pół godziny po zażyciu nie należy pić ani spożywać posiłków, aby zachować właściwości powłoki ochronnej. Może być używany niezależnie od pory dnia. Po każdym użyciu należy przepłukać kieliszek miarowy letnią wodą, pozostawić do wysuszenia (nie stosować środków i urządzeń do czyszczenia – zmywarka).

Środki ostrożności:

U dzieci może wywołać efekt przeczyszczający, jeśli jest stosowany w zbyt dużej ilości.

Należy stosować tylko zgodnie z instrukcją używania.

Stosowanie preparatu u dzieci poniżej 1. roku życia należy skonsultować z lekarzem.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ze względu na zawartość sacharozy (810 mg/5ml) zaleca się ostrożność w stosowaniu u osób chorych na cukrzycę.

Jeżeli wyrób jest stosowany pomocniczo podczas infekcji bakteryjnych i wirusowych, a objawy nie ustępują lub nasilają się po 7 dniach, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

* Posiada deklarację zgodności UE

* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.