

Contrahist Allergy 5mg 10 tabletek



cena: 9,84 pln

Opis słownikowy

Działanie	łagodzące, przeciwalergiczne
Opakowanie	10 sztuk
Postać	tabletki
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Levocetirizine
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	alergia, katar, kichanie, podrażnienie, świąd, uczulenie, zaczerwienienie

Opis produktu

Skład:
Każda tabletki powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum), co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny.

Wskazanie:
Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Dawkowanie:
Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u osób z rozpoznaniem przez lekarza alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub rozpoznaną przewlekłą pokrzywką idiopatyczną i według określonych przez niego zasad.
Dawkowanie Zaleca się przyjmowanie dawki raz na dobę. Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej: Zalecana dawka dobową wynosi 5 mg (1 tabletki powlekana). Osoby w podeszłym wieku:
U pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki produktu (patrz poniżej punkt „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: Zalecana dawka dobową wynosi 5 mg (1 tabletki powlekana). Dorośli pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Odstępy czasu pomiędzy kolejnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od stopnia wydolności nerek.

Przeciwwskazanie:
Nadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z kliresem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.