

# Deslodyna Fast Junior 2,5mg 10 tabletek

cena: 7,55 pln



## Opis słownikowy

Działanie	przeciwalergiczne
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabletki ulegające rozpuszczeniu w jamie ustnej
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Desloratadinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	alergia, katar, kichanie, podrażnienie, świąd, uczulenie, zacerwienie

## Opis produktu

### Opis:

Deslodyna fast junior to lek w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, działa przeciwalergicznie oraz nie wywołuje senności.

### Skład:

Substancją czynną jest desloratadyna.

Każda tabletki ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny (Desloratadinum).

Substancje pomocnicze: Polakrylina potasowa; Kwas cytrynowy jednowodny (do regulacji pH); Potasu wodorotlenek 50% (do regulacji pH); Mannitol; Celuloza mikrokrystaliczna; Kroskarmeloza sodowa; Aspartam (E 951); Żelaza tlenek czerwony (E 172); Aromat Tutti-Frutti SD 0272 (zawiera m.in. glikol propylenowy, alkohol benzylowy, cytral, geraniol, farnesol, linalol, d-limonen); Magnezu stearynian.

### Działanie:

Deslodyna fast junior działa przeciwalergicznie, nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

### Wskazania:

Lek Deslodyna fast junior jest wskazany w celu łagodzenia objawów związanych z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką.

### Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy umieścić w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę. Bez konsultacji z lekarzem nie należy przyjmować leku dłużej niż 10 dni. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje



się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej:

Zalecana dawka to dwie tabletki raz na dobę, przyjmowane z posiłkiem lub bez posiłku.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat:

Zalecana dawka to jedna tabletki raz na dobę, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

**Przeciwwskazania:**

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.