

Desmoxan 100 tabletek

cena: 50,80 pln



Opis słownikowy

Działanie	wspomagające
Opakowanie	100 sztuk
Postać	tabletki
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Cytisinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	rzucanie palenia

Opis produktu

Opis:

Lek Desmoxan to tabletki powlekane ułatwiające odzwyczajanie się od palenia tytoniu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego u osób z zamiarem rzucenia palenia. Lek umożliwi stopniowe likwidowanie uzależnienia organizmu od nikotyny, łagodząc objawy odstawienia, aby w konsekwencji palacz mógł trwale zaprzestać stosowania produktów nikotynowych. Produkt przeznaczony dla osób powyżej 18. roku życia.

Skład:

Substancją czynną leku jest cytyzyna.

1 tabletkę powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny.

Substancje pomocnicze: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, glicerolu dibehenian, hypromeloza.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie:

Desmoxan należy przyjmować doustnie, popijając odpowiednią ilością wody.

Działanie:

Cytyzyna zawarta w preparacie Desmoxan działa podobnie do nikotyny. Ze względu na to podobieństwo, po wchłonięciu do organizmu, zachowuje się jak "substytut" nikotyny. Łączy się z tymi samymi receptorami, blokując dostęp nikotynie. Dzięki temu zmniejsza objawy głodu nikotynowego i zależność od nikotyny.

Wskazania:

Lek stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku Desmoxan pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia

zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny.

Końcowym celem stosowania leku Desmoxan jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Desmoxan?

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (cytyzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,
w przypadku przebytego niedawno zawału serca lub udaru mózgu,
w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.