

DiaB12 60 kapsułek

cena: 29,29 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	układ nerwowy, układ odpornościowy
Działanie	wspomagające
Opakowanie	60 sztuk
Postać	kapsułki
Producent	FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENA"
Sposób aplikacji	doustnie
Wskazania	niedobór witamin, zmęczenie, znużenie

Opis produktu

Opis:

diaB12 to suplement diety zawierający witaminę B12 i kwas foliowy przeznaczony do uzupełniania witaminy B12 i kwasu foliowego u osób stosujących metforminę. Cyjanokobalamina to związek, który powszechnie jest znany jako witamina B12. Występuje ona w organizmach zwierząt, gdzie jest syntezowana wyłącznie przez bakterie. Podstawowym źródłem tej witaminy są produkty pochodzenia zwierzęcego. Foliacyna (foliany) to grupa rozpuszczalnych w wodzie związków heterocyklicznych. Aktywną formą folianów jest kwas foliowy, który powstaje z folianu, czyli soli kwasu foliowego, pod wpływem witaminy C.


Witamina B12 pomaga w:

prawidłowej produkcji czerwonych krwinek;
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego;
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny;
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego;
przyczynia się do:

utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego;
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;
odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

Foliany pomagają w:

utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny;
prawidłowej produkcji krwi;
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego;
prawidłowej syntezie aminokwasów;



biorą udział w procesie podziału komórek.

Składniki:

Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; żelatyna; skrobia modyfikowana; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; regulator kwasowości: cytrynian trisodowy; barwnik: dwutlenek tytanu; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; kwas pteroilomonoglutaminowy; cyjanokobalamina; barwnik: błękit patentowy V.

Sposób użycia:

Dorośli 1 kapsułka dziennie między posiłkami.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na cyjanokobalaminy, kobalt lub pozostałe składniki preparatu.

Środki ostrożności:

Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą Lebera, gdyż preparat może przyspieszyć zanik nerwu wzrokowego.