

Dulcosoft Junior syrop 100 ml



cena: 18,05 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	jelita
Działanie	łagodzące, przeczyszczające
Opakowanie	100 ml
Postać	płyn
Producent	OPELLA HEALTHCARE POLAND SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	zaparcia

Opis produktu

Opis:

DulcoSoft® Junior jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, którego głównym składnikiem jest makrogl 4000. Dzięki wysokiej zdolności wiązania wody służy jako jej nośnik i bezpośrednio transportuje ją do okrężnicy, dzięki czemu zmiękcza twarde masy kałowe, co prowadzi do nasilenia perystaltyki jelitowej i ułatwia wypróżnianie. DulcoSoft® Junior wywiera swoje działanie w sposób czysto fizyczny: nie jest wchłaniany przez organizm oraz ulega wydaleniu wraz z kałem w postaci niezmięnionej. Skuteczność produktu nie maleje przy dłuższym stosowaniu. Zazwyczaj zaczyna działać po 1-3 dniach stosowania. DulcoSoft® Junior może być przyjmowany w ciąży lub w okresie karmienia piersią. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny jednak skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem wyrobu medycznego DulcoSoft® Junior. Wyrób medyczny może być także stosowany u osób chorych na cukrzycę czy stosujących dietę niskosodową, po konsultacji z lekarzem.

Skład:

10 ml płynu DULCOSOFT® zawiera 5 g makroglu 4000. Roztwór jest dostępny w opakowaniach po 100 ml.

Pozostałe składniki:

sorbinian potasu (środek konserwujący), makrogl 400, kwas cytrynowy, woda oczyszczona

Sposób użycia:

Należy rozpuścić dawkę DulcoSoft® Junior bezpośrednio przed przyjęciem w szklance dowolnego płynu (około 150 ml). Nie zmienia smaku napoju. Najlepiej przyjmować go w pojedynczej dawce rano.

Dorośli i dzieci powyżej 8. roku życia: 20-40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10-20 g makroglu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.

W przypadku stosowania produktu u dzieci poniżej 8. roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat: 16-32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8-16 g makroglu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.

Dzieci w wieku od 2 do 3 lat: 8-16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4-8 g makroglu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce



przyjmowane są.

Uwaga:

DULCOSOFT® zazwyczaj zaczyna działać po 24 – 72 godzinach stosowania. Badania kliniczne potwierdzają, że w przypadku regularnego przyjmowania produktu wypróżnienia zazwyczaj występują raz na dobę.

Jeżeli zaparcia będą się utrzymywać, należy zbadać ich przyczynę. Dzieci nie powinny stosować produktu DULCOSOFT® przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zastosowanie dawki większej niż zalecana

Zbyt duże dawki produktu DULCOSOFT® mogą spowodować biegunkę, bóle brzucha, wzdęcie brzucha i wymioty. Objawy te ustępują po przerwaniu leczenia lub zmniejszeniu dawki. Znaczna utrata płynów

z powodu biegunki lub wymiotów może wymagać leczenia zaburzeń gospodarki elektrolitowej. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

* Posiada deklarację zgodności UE

* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.