

Duphalac 150 ml



cena: 12,67 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Cześć ciała | jelita |
| Działanie | przeczyszczające |
| Opakowanie | 150 ml |
| Postać | roztwór |
| Producent | MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O. |
| Sposób aplikacji | doustnie |
| Substancja czynna/dawka | Lactulosum |
| Typ produktu | Lek bez recepty |
| Wskazania | zaparcia |

Opis produktu

Opis:

Duphalac zawiera laktulozę, która wykazuje działanie przeczyszczające (działa osmotycznie) - zmiękcza stolec i ułatwia jego przemieszczanie. Laktuloza nie jest wchłaniana do organizmu, powoduje przenikanie wody do światła jelita. Laktuloza w sposób pośredni stymuluje perystaltykę okrężnicy i prowadzi do przywrócenia prawidłowej konsystencji stolca.

Skład:

Substancją czynną jest: laktuloza (Lactulosum).

1 ml roztworu zawiera 667 mg laktulozy.

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona.

Lek może zawierać cukry takie jak laktoza, galaktoza i fruktoza, jako pozostałość z procesu syntezy.

Duphalac może zawierać siarczyny, jako pozostałość z procesu syntezy.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Zaparcia lub w celu zmiękczenia stolca:

Kolejne dawki należy przyjmować o tej samej porze. Można stosować 1 raz dziennie, np. w czasie śniadania lub w dwóch podzielonych.

Lek może być stosowany nierozcieńczony lub rozcieńczony.

Do opakowania dołączona jest miarka.

Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni) leczenia.

Leki przeczyszczające powinny być stosowane u dzieci, niemowląt i noworodków pod nadzorem lekarza.

Lek Duphalac u dzieci poniżej 14 lat nie należy podawać bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku encefalopatii wątrobowej (wyłącznie u osób dorosłych) dawka początkowa: 30-45 ml 3-4 razy dziennie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli występują niewyjaśnione bóle brzucha, pacjent nie trawi cukru mlecznego (laktozy), cukrzyca. Nie stosować tego leku w przypadku: nietolerancji galaktozy, fruktozy, niedoboru laktazy typu Lapp, złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Podczas leczenia laktulozą odruch wypróżniania może ulec zaburzeniu. Nadużywanie, zbyt duża dawka może prowadzić do biegunki i zaburzeń elektrolitowych. W trakcie stosowania leków przeczyszczających należy pamiętać o wypijaniu odpowiednich ilości płynów (2 litry na dobę, czyli ok. 6-8 szklanek). Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

Lek Duphalac może być stosowany niezależnie od posiłku. Podczas stosowania leku należy wypijać co najmniej 2 litry wody.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Duphalac może być przyjmowany w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

U dzieci poniżej 14 lat, lek ten powinien być stosowany jedynie na zlecenie lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.