


# Fenistil krople 1 mg/ml 20 ml



cena: 18,13 pln

## Opis słownikowy

Cześć ciała	skóra
Działanie	przeciwalergiczne, przeciwświądowe
Opakowanie	20 ml
Postać	krople
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Dimetindenum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	alergia, świąd, uczulenie, ukąszenie

## Opis produktu

### Opis:

Fenistil krople to lek przeciwhistaminowy stosowany doustnie, który łagodzi wysypkę, świąd, katar sienny i nieżyt nosa oraz objawy alergii skórnych.

Fenistil krople blokuje działanie histaminy, która jest substancją uwalnianą w organizmie podczas reakcji alergicznych. Fenistil krople łagodzi świąd i podrażnienia spowodowane wysypką, zmniejsza obrzęk i pomaga złagodzić objawy nieżytów nosa: katar, kichanie, swędzenie nosa oraz swędzenie i łzawienie oczu.

### Wskazania:

Leczenie objawów chorób alergicznych, takich jak: pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego wyprysku kontaktowego, wyprysku endogennego.

Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny) i przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. w przypadku uczulenia na kurz domowy, sierść zwierząt, pierze).

Leczenie objawowe alergii pokarmowych oraz polekowych oraz łagodzenie świądu towarzyszącego chorobom zakaźnym (np. ospie). Łagodzenie objawów występujących po ukąszeniu owadów oraz zapobieganie reakcjom alergicznym występującym podczas odczulania.

### Skład:

Substancją czynną preparatu Fenistil krople jest maleinian dimetyndenu. Jeden mililitr leku Fenistil krople zawiera 1 mg maleinianu dimetyndenu.

Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, kwas benzoesowy, disodu edetynian, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.

### Sposób użycia:

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 20 do 40 kropli trzy razy dziennie.

Dzieci: niemowlęta od 1 miesiąca do 1 roku tylko na zalecenie lekarza: Zalecana dawka wynosi 2 krople na kg masy ciała na dobę, podzielone na trzy dawki, np. 6 kropli trzy razy na dobę dla 8-miesięcznego dziecka ważącego 9 kg.

Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat: Zalecana dawka dobową wynosi 2 krople na kg masy ciała na dobę, podzielona na trzy dawki, np. 8 kropli trzy razy na dobę dla 2-letniego dziecka ważącego 12 kg.

Nie podawać leku niemowlętom od 1 miesiąca do 1 roku, chyba że zostanie przepisany przez lekarza.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Krople Fenistil do stosowania doustnego nie powinny być poddawane działaniu wysokich temperatur. W przypadku małych dzieci, lek należy dodać do butelki dziecka bezpośrednio przed karmieniem, kiedy pokarm jest letni. Jeśli dziecko jest karmione łyżeczką, lek należy podawać w postaci nierozcieńczonej na łyżeczce.

Zawsze należy przyjmować lek zgodnie z treścią ulotki, zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fenistil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką. Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku u pacjentów: jaskrę,

z jaskrą,

zatrzymaniem moczu spowodowanym, np. rozrostem gruczołu krokowego,

z padaczką,

w podeszłym wieku

Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej podatni na występowanie działań niepożądanych, takich jak pobudzenie i zmęczenie. Leku nie należy stosować u pacjentów w podeszłym wieku z dezorientacją.

Tak jak w przypadku wszystkich antagonistów receptorów H1 i H2 należy zachować ostrożność u pacjentów chorych na epilepsję.

Zaobserwowano, że u małych dzieci leki przeciwhistaminowe mogą wywoływać pobudzenie.

#### **Fenistil krople a inne leki:**

Bez konsultacji z lekarzem leku Fenistil krople nie mogą stosować pacjenci przyjmujący następujące środki farmakologiczne:

leki przeciwdepresyjne,

leki przeciwochłoniergiczne, takie jak: rozszerzające oskrzela (leki stosowane w leczeniu astmy i skurczach oskrzeli), leki stosowane w stanach skurczowych w obrębie jamy brzusznej (leki stosowane w zapobieganiu skurczu żołądka i jelit), leki rozszerzające źrenice,

urologiczne leki przeciwskurczowe (leki stosowane w leczeniu objawów nietrzymania moczu i nadmiernej aktywności pęcherza),

leki nasenne, uspokajające,

leki przeciwdrgawkowe (stosowane w leczeniu padaczki),

opiodowe leki przeciwbólowe,

leki antyhistaminowe (leki stosowane w leczeniu zwykłego kaszlu, przeziębienia lub innych alergii),

leki przeciwwymiotne (stosowane w celu zatrzymania wymiotów),

prokarbazyna (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów),

skopolamina (lek zapobiegający chorobie lokomocyjnej),

alkohol.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, w tym środkach wydawanych bez recepty.

#### **Fenistil krople a spożywanie alkoholu:**

Podobnie jak wiele innych leków przeciwhistaminowych, Fenistil krople może nasilać działanie alkoholu.

#### **Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:**

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Dopuszcza się stosowanie leku Fenistil w okresie ciąży w przypadku ściśle określonych wskazań, na zalecenie lekarza. Nie należy stosować leku Fenistil u kobiet karmiących piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.