

## Flegamina 8 mg 40 tabletek



cena: 25,93 pln

### Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe
Działanie	wykrztuśne
Opakowanie	40 sztuk
Postać	tabletki
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Bromhexinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	kaszel mokry

### Opis produktu

#### Opis:

Flegamina to lek wykrztuśny, upłynniający wydzielinę z dróg oddechowych, a przez to ułatwiający oczyszczenie oskrzeli. Produkt leczniczy jest stosowany w kaszlu mokrym.

#### Skład:

Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek (Bromhexini hydrochloridum).

1 tabletkę zawiera 8mg chlorowodoru bromoheksyny.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

#### Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

W trakcie stosowania preparatu zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów.

Nie stosować przed snem.

Produkt leczniczy należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.

Lek stosuje się zwykle przez 7 do 10 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

#### Działanie:

Chlorowodorek bromoheksyny należy do grupy leków mukolitycznych, ich działanie polega na rozrzedzaniu wydzieliny śluzowej



zalegającej w drzewie oskrzelowym. Bromoheksyna ułatwia wykrztuszanie gęstej wydzieliny a także poprawia czynność nabłonka  
ręskowego.

**Wskazania:**

Wskazaniem do stosowania leku Flegamina są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Lek może nasilać chorobę wrzodową dwunastnicy i żołądka.

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.