

# Furaginum Max Us Pharmacia 100mg 30 tabletek



cena: 17,47 pln

## Opis słownikowy

Cześć ciała	nerki, pęcherz, układ moczowy
Działanie	wspomagające
Opakowanie	30 sztuk
Postać	tabletki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Furazidinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	infekcja, zakażenie, zapalenie pęcherza moczowego

## Opis produktu

### Opis:

Lek Furaginum MAX US Pharmacia działa na wiele gatunków bakterii, w tym bakterię E. coli, która w ok. 90% przypadków jest przyczyną zakażenia dróg moczowych. Złożony mechanizm działania Furaginum US Pharmacia skutecznie zaburza procesy życiowe w komórkach bakteryjnych ograniczając ich wzrost i namnażanie.

Po zażyciu 1 tabletki (100 mg) już po upływie godziny osiąga maksymalne stężenie w osoczu i rozpoczyna leczenie.

### Skład:

1 tabletki zawiera: substancję czynną: 100 mg furazydyny zwanej także furaginą oraz substancje pomocnicze: m.in. laktozę i sacharozę

### Wskazania:

Leczenie ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.

### Sposób użycia:

Stosuje się doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat:

Pierwszy dzień leczenia: 1 tabletki 4 razy na dobę

Następne dni: 1 tabletki 3 razy na dobę.

Lek należy stosować przez 7-8 dni.

Jest to ważne, gdyż niedoleczone infekcje często nawracają, a dodatkowo może to zwiększać oporność bakterii i w rezultacie obniżyć skuteczność działania leku w przyszłości.

W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na furaginę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników, I trymestr ciąży, okres donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, wiek poniżej 15 lat, niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy), polineuropatia np. w przebiegu cukrzycy, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.