


## Gardimax Medica Junior truskawkowy 24 tabletki do ssania



cena: 17,45 pln

### Opis słownikowy

Cześć ciała	gardło
Działanie	przeciwbakteryjne, znieczulające
Opakowanie	24 tabl. (2 blist. po 12 tabl.)
Postać	tabletki
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Chlorhexidinum, Lidocainum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	ból, infekcja, podrażnienie, stan zapalny

### Opis produktu

#### Opis:

Gardimax medica junior truskawkowy zawiera jako substancje czynne lidokainy chlorowodorek o działaniu miejscowo znieczulającym oraz chloroheksydyny dichlorowodorek o działaniu przeciwbakteryjnym.

Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Produkt leczniczy do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

#### Skład:

1 tabletki do ssania zawiera: 5 mg chloroheksydyny dichlorowodoru (Chlorhexidini dihydrochloridum) i 1 mg lidokainy chlorowodoru jednowodnego (Lidocaini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1189,9 mg sorbitolu w każdej tabletki

#### Sposób użycia:

Dorośli: 6 do 10 tabletek do ssania na dobę.

Dzieci w wieku od 6 lat: 3 do 5 tabletek do ssania na dobę.

Tabletkę ssać powoli.

Lek do krótkotrwałego stosowania objawowego: 3 do 4 dni. Jeśli po tym okresie nie nastąpi poprawa lub już w trakcie stosowania pojawią się nowe dolegliwości i (lub) objawy ogólne, np. gorączka, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

#### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów, lub na którąkolwiek



Forvital Sp. z o.o. Sp. K.  
ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan  
+48 722 101 968

substancją pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.