

Gaviscon o smaku mięty 24 tabletki

cena: 17,37 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	dwunastnica, przełyk, żołądek
Działanie	łagodzące, osłaniające, zobojętniające
Opakowanie	24 sztuki (blistry)
Postać	tabl. do rozgryzania i żucia
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Natrii alginas, Natrii hydrogenocarbonas, Calcii carbonas
Wskazania	nadwrażliwość, pieczenie, podrażnienie, wrzody, zgaga

Opis produktu

Opis

Gaviscon o smaku mięty TAB jest produktem leczniczym tworzącym ochronną warstwę, która zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka.

Skład

Substancjami czynnymi leku są alginianu sodu (Natrii alginas), wodorowęglan sodu (Natrii hydrogenocarbonas) oraz węglan wapnia (Calcii carbonas).

1 tabletkę zawiera 250 mg alginianu sodu, 133,5 mg wodorowęglanu sodu oraz 80 mg węglanu wapnia.

Substancje pomocnicze: mannitol (E421), makrogol 20 000, kopowidon, aspartam (E951), aromat mięty pieprzowej, magnezu stearynian oraz acesulfam potasowy.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka leku Gaviscon osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia to od 2 do 4 tabletek w przypadku wystąpienia objawów po posiłkach i przed snem.

Nie przekraczać 16 tabletek na dobę.

Jeśli objawy nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Działanie

Lek Gaviscon o smaku mięty TAB tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej. Warstwa ta zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje zmniejszenie bólu i uczucia dyskomfortu w gardle i jamie ustnej. Zgaga może pojawiać się po posiłkach (głównie tłustych i ostrych) lub podczas ciąży, lub u pacjentów z objawami zapalenia ściany przełyku (np. trudnościami i (lub) utrudnionym przełykaniem, bólem w jamie ustnej, wymiotami).

Wskazania

Gaviscon o smaku mięty TAB jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak:

odbijanie,

zgaga,

niestrawność,

na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

Przeciwwskazania

Leku Gaviscon TAB nie powinno się przyjmować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Gaviscon o smaku mięty TAB może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy, takie jak:

wysypka skórna, świąd,

trudności w oddychaniu,

zawroty głowy,

obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera sód i wapń.

Lek zawiera źródło fenylealaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenylketonurią.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować tego leku w ciągu dwóch godzin od doustnego zastosowania innych leków ponieważ może to wpływać na skuteczność niektórych leków

Ciąża i karmienie piersią

Lek ten można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Producent

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE

Dansom Lane

Hull HU8 7DS, UK