


Groprinosin Forte syrop 500mg/5ml 150ml



cena: 17,95 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe, układ odpornościowy
Działanie	wspomagające
Opakowanie	150 ml (but.)
Postać	syrop
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Inosinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	infekcja, opryszczka, osłabienie, osłabienie odporności

Opis produktu

Opis:

Syrop Groprinosin® Forte posiada specjalną nakrętkę z pierścieniem zabezpieczającym przed niepożądanym otwarciem przez dziecko. Do opakowania dołączona jest miarka o pojemności 20 ml z podziałką co 2,5 ml. Lek pobudza układ odpornościowy do walki z wirusami.

Skład:

1 ml syropu Groprinosin® Forte zawiera 100 mg inozyiny pranobeks (Inosinum pranobexum).

Wskazania:

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolite (Herpes simplex).

Dawkowanie:

Produkt leczniczy przeznaczony jest wyłącznie do podawania doustnego. Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobową powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 0,5 ml/kg mc. podawanych w 3 lub 4 równych dawkach podzielonych w ciągu doby; stosować zgodnie z poniższą tabelą.

*W celu odmierzenia zalecanej objętości, należy stosować dołączoną do opakowania miarkę o pojemności 20 ml, z podziałką co 2,5 ml. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: Zalecana dawka dobową wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml/kg mc. na dobę), zwykle 3 g (czyli 30 ml syropu na dobę), podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę (czyli 40 ml syropu na dobę).

Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie produktu leczniczego należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyliny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.