


Groprinosin syrop 50 mg/ml 150 ml



cena: 14,40 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe, układ odpornościowy
Działanie	wspomagające
Opakowanie	150 ml
Postać	syrop
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Inosinum pranobexum
Wskazania	infekcja, opryszczka, osłabienie, osłabienie odporności

Opis produktu

Opis:

Groprinosin® to lek mający na celu pobudzenie układu odpornościowego do walki z wirusami.

Syrop Groprinosin posiada specjalną nakrętkę z pierścieniem zabezpieczającym przed niepożądanym otwarciem przez dziecko. Do opakowania dołączona jest miarka o pojemności 20 ml, z podziałką co 2,5 ml. Lek pobudza układ odpornościowy do walki z wirusami.

Skład:

1 ml syropu Groprinosin zawiera 50,0 mg inozyiny pranobeks (Inosinum pranobexum).

Wskazania do stosowania:

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywoływanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Dawkowanie syropu Groprinosin:

Produkt leczniczy przeznaczony jest wyłącznie do podawania doustnego. Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobową powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 1 ml/1 kg mc. podawanych w 3 lub 4 równych dawkach podzielonych w ciągu doby. Stosować zgodnie z poniższą tabelą.

Czas trwania leczenia:

Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyliny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.