

Halset 1,5mg 24 tabletki do ssania



cena: 15,53 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	gardło, jama ustna
Działanie	przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze
Opakowanie	24 tabl. (4 blist. po 6 tabl.)
Postać	tabletki
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Cetylpyridinium
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	ból, infekcja, stan zapalny

Opis produktu

Opis

Halset to produkt leczniczy o działaniu odkażającym w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła do stosowania w przypadku zakażeń bakteryjnych i niektórych grzybiczych. Smak miętowy.

Skład

Substancją czynną jest: cetylopyrydyniowy chlorek.

1 tabletki zawiera 1,5 mg cetylopyrydyniowego chlorku jednowodnego.

Substancje pomocnicze: sorbitol, olejek miętowy, mentol, magnezu stearynian.

Lek nie zawiera cukru.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego, do ssania.

Tabletek nie należy rozgryzać.

Dorośli i młodzież: 1 tabletki co 1-2 godziny (maksymalnie 8 tabletek na dobę).

Dzieci powyżej 6 lat: 1 tabletki co 2-3 godziny (maksymalnie 6 tabletek na dobę).

Działanie

Halset jest lekiem stosowanym w chorobach gardła jako środek odkażający. Chlorek cetylopyrydyniowy wykazuje łagodne działanie odkażające - działa przeciwbakteryjnie (bakteriobójczo) i na grzyby (*Candida albicans*).

Wskazania

Zapobieganie i leczenie lekkich i średnio ciężkich stanów zapalnych gardła i jamy ustnej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Halset:

w przypadku nadwrażliwości na chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku nietolerancji fruktozy.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka),
uczucie pieczenia w jamie ustnej,
nudności,
przemijające zaburzenia smaku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia wysypki lub innego objawu alergicznego należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli zakażenie lub ból gardła mają ciężki przebieg, towarzyszy mu gorączka (wysoka temperatura), ból głowy, nudności, wymioty, należy skonsultować się z lekarzem, szczególnie, gdy po 3 dniach stosowania leku objawy nie ustąpią.

Lek zawiera sorbitol - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 6 lat ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia się tabletką.

Producent

BIOFARM
Wałbrzyska 13
Poznań

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.