

Hitaxa Fast Junior 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 szt.



cena: 12,38 pln

Opis słownikowy

Działanie	łagodzące, przeciwalergiczne, przeciwświądowe
Opakowanie	10 sztuk
Postać	tabletki
Producent	ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Desloratadinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	alergia, drażliwość, kaszel, katar, kichanie, pieczenie, podrażnienie, świąd, uczulenie

Opis produktu

Opis:
Produkt leczniczy łagodzący objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Dla dzieci od 6 roku życia.

Skład:
Każda tabletki ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny.

Wskazania:
Produkt Hitaxa Fast Junior jest wskazany w celu łagodzenia objawów związanych z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub pokrzywką.

Sposób użycia:
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): dwie 2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej produktu Hitaxa fast junior umieścić w jamie ustnej raz na dobę w celu złagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym okresowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i pokrzywką. Dzieci w wieku 6 do 11 lat: jedną 2,5 mg tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej produktu Hitaxa fast junior umieścić w jamie ustnej raz na dobę w celu złagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym okresowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i pokrzywką. Nie ma wystarczających danych z badań klinicznych dotyczących skuteczności stosowania desloratadyny u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki desloratadyną bez konsultacji lekarskiej nie powinno trwać dłużej niż 10 dni. Sposób podawania: dawkę można przyjmować niezależnie od posiłku. Bezpośrednio przed użyciem blister należy ostrożnie otworzyć i wyjąć bez kruszenia tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej. Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej umieszcza się w jamie ustnej, gdzie ulega on



natychmiastowemu rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połączyć dawkę. Dawkę należy przyjąć natychmiast po otwarciu blistra

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.