

Honikan Gardło i Kaszel żel 10 saszetek

cena: 18,51 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe, gardło
Działanie	łagodzące, wspomagające
Opakowanie	10 saszetek
Postać	żel
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	ból, kaszel mokry, kaszel suchy, podrażnienie

Opis produktu

Opis:

Żel zawiera miód, daktyle i ekstrakty roślinne z tymianku, mirtu i prawoślazu.

Preparat został opracowany w taki sposób, aby przylegać do błony śluzowej jamy ustnej i ograniczać jej kontakt z czynnikami zewnętrznymi: polisacharydy mają zdolność pochłaniania dużych ilości wody, co pomaga utrzymać poziom nawilżenia błony śluzowej jamy ustnej i górnych dróg oddechowych (przy kaszlu suchym) oraz sprzyja upłynnianiu i usuwaniu śluzu (przy kaszlu mokrym).

Składniki:

Woda, Miód, Koncentrat soku z daktyli, Suchy ekstrakt z liści tymianku, Suchy ekstrakt z korzenia prawoślazu, Suchy ekstrakt z liści mirtu, Karboksymetyloceluloza sodowa, Guma ksantanowa, Kwas cytrynowy, Aromat cytrynowy, Sorbinian potasu, Benzoosan sodu, Olejek eteryczny z mirtu.

BEZGLUTENOWY,
NATURALNIE BEZ LAKTOZY

Wskazania:

Wyrób medyczny na bazie miodu, daktyli i ekstraktów roślinnych, wskazany w leczeniu bólu gardła oraz w przypadku kaszlu zarówno suchego, jak i mokrego. Żel wycisnięty bezpośrednio z saszetki do jamy ustnej zaczyna działać ochronnie i w konsekwencji przynosi ulgę.

Działa ochronnie i łagodząco na górne drogi oddechowe. Jego składniki przylegają do błony śluzowej jamy ustnej i ograniczają jej kontakt z czynnikami zewnętrznymi.

Sposób użycia:

Żel do bezpośredniego stosowania.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

1 saszetka, 2 do 4 razy dziennie lub postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie trzeba długo czekać pomiędzy zastosowaniem kolejnych saszetek. Nie jeść i nie pić przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu.

Okres stosowania zależy od potrzeby i szybkości ustępowania objawów.

W razie potrzeby produkt może być stosowany dłużej, nawet 30 dni.

Ostrzeżenia:

Produkt przeznaczony jest do podawania doustnego.

Nie może być stosowany przez osoby, u których występuje nadwrażliwość lub uczulenie na jeden lub więcej składników.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży, karmienia piersią lub podawaniem go dzieciom poniżej 3 lat.

Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności.

Nie stosować, jeśli opakowanie lub saszetka są uszkodzone.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać instrukcji użycia.

Przed zastosowaniem preparatu w połączeniu z innymi lekami należy skonsultować się z lekarzem.

Po zastosowaniu należy w sposób odpowiedzialny pozbyć się opakowania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

* Posiada deklarację zgodności UE

* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.