

Iberogast płyn doustny 20 ml



cena: 32,61 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	jelita, żołądek
Działanie	wspomagające
Opakowanie	20 ml (but.)
Postać	płyn
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Productum compositum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	ból, nudności, skurcze, wzdęcia, zgaga

Opis produktu

Iberogast jest lekiem roślinnym do stosowania w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, związanych z motoryką (pasażem) przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja (niestrawność) czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą.

Iberogast łagodzi uczucie pełności, wzdęcia, osłabia skurcze żołądka i jelit. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, wiatropędne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne.

Stosowanie:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej Iberogast® przyjmuje się w małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków. Zalecana dawka leku to:

dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 20 kropli
dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli
dzieci w wieku poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania.
Lek Iberogast® można stosować bez ograniczeń czasowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Jeśli u pacjenta wystąpi zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu, odbarwienie stolca, ból w nadbrzuszu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Iberogast i skonsultować się z lekarzem. Mogą to być objawy uszkodzenia wątroby. Pacjenci ze stwierdzoną chorobą wątroby powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Iberogast.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpi poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem, aby wykluczyć inne poważne choroby.



Forvital Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.