

Ibuprom Sport żel 0,05 g/g żel 60 g



cena: 18,17 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	kręgosłup, mięśnie, plecy, stawy
Działanie	przeciwbólowe, przeciwzapalne
Opakowanie	60 g
Postać	żel
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	na skórę
Substancja czynna/dawka	Ibuprofenum
Wskazania	ból, reumatyzm, siniaki, stan zapalny, stłuczenie, zapalenie, zwichnięcie

Opis produktu

Wskazania:

Ibuprofen działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Jego działanie jest uwarunkowane hamowaniem syntezy prostaglandyn w zmienionej zapalnie tkance.

- miejscowe leczenie bólów mięśni,
- leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa,
- leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kałek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgniastych, więzadeł i torebek stawowych),
- leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

Skład:

Substancją czynną jest ibuprofen.

Pozostałe składniki to: etanol 96%, alkohol izopropylowy, hydroksyetyloceluloza, lewomentol, aromat Reflex 12122 (metylu salicylan), glikolu dietylenowego monoetylowy eter, makrogoliglicerydów kaprylokaproniany (Makrogol 400), glicerol, sodu wodorotlenek (10% roztwór wodny), woda oczyszczona.

Stosowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek IBUPROM SPORT żel stosuje się miejscowo, na skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku IBUPROM SPORT żel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Leku IBUPROM SPORT żel nie należy stosować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolice oczu.

Lek IBUPROM SPORT żel należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, niewydolnością nerek, astmą oskrzelową i nietolerancją kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych NLPZ przyjmowanych doustnie.

W trakcie stosowania leku IBUPROM SPORT żel należy unikać wystawiania leczonej powierzchni ciała na działanie promieni słonecznych, gdyż grozi to wystąpieniem reakcji nadwrażliwości na światło (fotouczulenia).

Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka, należy przerwać stosowanie leku. Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu leku należy umyć ręce.

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław