

Inaldin Gardło MAX 30 ml



cena: 14,80 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	gardło, jama ustna
Działanie	przeciwbólowe, przeciwzapalne, znieczulające
Opakowanie	30 ml
Postać	aeroszol
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Benzydaminum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	ból, obrzęk, zaczerwienienie

Opis produktu

Opis:

Inaldin Gardło to produkt leczniczy, aeroszol do stosowania w bólu jamy ustnej i gardła, w stanach zapalnych z zaczerwienieniem, obrzękiem. Lek Inaldin Gardło Max zawiera benzydaminę, która działa odkażająco, przeciwzapalnie i znieczula miejscowo oraz zmniejsza obrzęk.

Skład:

Substancją czynną leku jest: chlorowodorek benzydaminu (Benzydaminum hydrochloridum).

1 ml roztworu zawiera 3 mg chlorowodoru benzydaminu.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), sodu cyklaminian (E 952), glicerol (E 422), sodu wodorowęglan, polisorbat 80, etanol 96%, aromat mięty pieprzowej zawierający olejek mięty pieprzowej, etanol, mentol, kwas fosforowy stężony (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Sposób użycia:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Inaldin Gardło Max stosuje się na błony śluzowe jamy ustnej i gardła.

Produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 7 dni.

Przed pierwszym użyciem, butelkę w pozycji pionowej należy kilkakrotnie (ok. 5 razy) nacisnąć dozownik w celu jego odpowiedniego napełnienia i otrzymania prawidłowego rozpylenia aeroszolu.

Dorośli Zalecana dawka aeroszolu to od 2 do 4 dawek każdorazowo (zawierających od 1,02 do 2,04 mg benzydaminu chlorowodoru, co odpowiada od 0,91 do 1,82 mg benzydaminu) od 2 do 6 razy na dobę; nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny.

Wskazania:

Leczenie objawowe (ból, obrzęk, zaczerwienienia) stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Inaldin Gardło Max: w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną - benzydaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego produktu leczniczego.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) – nadwrażliwość na światło.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) – pieczenie i suchość w jamie ustnej.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) – trudności w oddychaniu lub przełykaniu (skurcz krtani lub skurcz oskrzeli).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosowanie produktu leczniczego Inaldin Gardło należy omówić z lekarzem lub farmaceutą jeśli w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa na kwas acetylosalicylowy, inne leki z grupy NLPZ lub jeśli w przeszłości wystąpiła astma.

Jeśli podczas stosowania wystąpiły owrzodzenia w obrębie jamy ustnej, należy skonsultować się z lekarzem.

Po zastosowaniu aerozolu może wystąpić pieczenie/drętwienie w jamie ustnej/gardle - tego typu reakcja jest normalna - związana z profilem działania leku i ustępuje po krótkim czasie.

Podczas stosowania należy unikać kontaktu z oczami.

Produkt leczniczy zawiera E218 - parahydroksybenzoosan metylu, który może powodować reakcje alergiczne.

Inaldin Gardło zawiera małe ilości etanolu (mniej niż 100 mg w 1 dawce).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym użyciu: 160 dni.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.