

Inovox Express o smaku pomarańczowym, 24 pastylki



cena: 22,77 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	gardło, jama ustna
Działanie	antyseptyczne, przeciwbakteryjne, przeciwbólowe, przeciwgrzybicze, znieczulające
Opakowanie	24 sztuki
Postać	pastylki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	1 pastylka: lidokainy chlorowodorek 2 mg, amyloetakrezol 0,6 mg, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 1,20 mg
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	ból, infekcja

Opis produktu

Opis

INOVOX Express to lek miejscowo łagodzący ból gardła. Jego składniki wykazują również działanie odkażające. Smak pomarańczowy.

Skład

Substancjami czynnymi leku są lidokainy chlorowodorek, amyloetakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy.

Jedna pastylka twarda zawiera:

Lidokainy chlorowodoru - 2,00 mg,

Amyloetakrezol - 0,60 mg,

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy - 1,20 mg.

Substancje pomocnicze: lewomentol, sacharyna sodowa (E954), sacharoza, glukoza ciekła, żółcień pomarańczowa (E110), czerwień koszenilowa (E124), kwas cytrynowy jednowodny (E330), aromat pomarańczowy.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: co 2 do 3 godzin powoli rozpuszczać w jamie ustnej jedną pastylkę.

Stosować maksymalnie do 8 pastylek w ciągu 24 godzin (maksymalnie 4 pastylki u młodzieży).

Nie umieszczać pomiędzy dziąsłem a policzkiem.

Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Leku nie zaleca się stosować dłużej niż 5 dni. Dłuższe stosowanie może wpłynąć na naturalną florę bakteryjną występującą w gardle.

Działanie

Inovox Express zawiera antyseptyki - amylometakrezol i alkohol 2,4-dichlorobenzylowy oraz środek miejscowo znieczulający do gardła - lidokainy chlorowodorek. Antyseptyki odpowiadają za działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Substancje te wykazują również właściwości przeciwwirusowe. Połączenie antyseptyków z lidokainą sprawia, że lek działa przeciwbólowo i ułatwia przełykanie.

Wskazania

Inovox Express stosuje się do:
miejscowego leczenia antyseptycznego stanów zapalnych gardła i jamy ustnej,
łagodzenie objawów bólu gardła.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Inovox Express:

Jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainy chlorowodorek lub inne amidowe miejscowe środki znieczulające, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Inovox Express i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

obrzęk twarzy, języka lub gardła,

trudności w połykaniu,

pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Rzadko występujące działania niepożądane (nie częściej niż u 1 osoby na 1000):

reakcje nadwrażliwości (pieczenie, świąd),

obrzęk naczynioruchowy,

pieczenie w gardle i nieprzyjemny smak.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek może powodować drętwienie języka i zwiększać ryzyko ugryzienia się.

Przed zastosowaniem u astmatyków należy skontaktować się z lekarzem.

Należy przestrzegać zalecanego dawkowania: lek przyjmowany w dużych dawkach lub długotrwale, może wpływać na serce lub układ nerwowy i może powodować drgawki.

Leku nie należy stosować, jeśli w jamie ustnej i gardle występują większe niezagojone rany.

Lek może być szkodliwy dla zębów.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu któregośkolwiek z leków wymienionych poniżej, ponieważ może być konieczne dostosowanie ich dawki:

leki blokujące receptory beta (stosowane w leczeniu niewydolności serca lub choroby tętnic) lub leki zawierające cymetydynę (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka),

inne środki miejscowo znieczulające (amidowe),

leki stosowane w leczeniu chorób serca, takie jak meksyletyna lub prokainamid,

leki, takie jak fluwoksamina (stosowane w leczeniu depresji),

antybiotyki, takie jak erytromycyna, lub itrakonazol.

Mimo, że nie powinny wystąpić żadne interakcje, nie należy przyjmować innych środków antyseptycznych do stosowania w jamie ustnej lub gardle podczas stosowania leku Inovox Express.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićciem

Nie należy stosować tego leku przed posiłkiem lub wypiciem napoju. Przyjęcie leku przed posiłkiem może u niektórych pacjentów zwiększyć ryzyko zachłyśnięcia się.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.



nie zaleca się stosowania leków w trakcie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować tego leku u dzieci w w wieku poniżej 12 lat.

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Producent

US PHARMACIA WROCLAW
Ziębicka 40
Wrocław

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.