

Junior-angin Syrop dla dzieci 100ml

cena: 17,99 pln



Opis słownikowy

| | |
|------------------|---|
| Cześć ciała | drogi oddechowe, gardło, jama ustna |
| Działanie | łagodzące, wspomagające |
| Opakowanie | 100 ml |
| Postać | syrop |
| Producent | M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z O.O. |
| Sposób aplikacji | doustnie |
| Typ produktu | Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą. |
| Wskazania | ból, kaszel suchy, podrażnienie, suchość |

Opis produktu

Opis:

Junior-angin syrop dla dzieci stosuje się w suchym, drażniącym kaszlu, bólu gardła oraz w podrażnieniach błony śluzowej jamy ustnej i gardła towarzyszącym przeziębieniom.

Porost islandzki stosowany jest w bólu gardła oraz w suchym, drażniącym kaszlu ze względu na zawarte w nim substancje śluzowe, wykazujące działanie łagodzące podrażnienia, które jak balsam powlekają błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Malwa stosowana jest w podrażnieniach błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz w związanych z nimi: bólu gardła i suchym, drażniącym kaszlu. Liście i kwiaty malwy zawierają substancje śluzowe łagodzące podrażnienia.

Skład:

100 ml syropu zawiera:

5 g wyciągu z porostu islandzkiego

5 g wyciągu z malwy

Pozostałe składniki:

Glukonian cynku, sorbinian potasu, roztwór maltitolu, aromat aereśniowy, aromat ziołowy, woda oczyszczona.

Nie zawiera alkoholu i cukru.

Nie zawiera sztucznych barwników, laktozy, glutenu.

Sposób użycia:

Junior-angin syrop dla dzieci należy stosować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci od 1 do 6 lat:

W zależności od potrzeby podawać raz lub dwa razy dziennie po 5 ml junior-angin syropu dla dzieci.

Nie ma doświadczeń w stosowaniu junior-angin syrop dla dzieci u dzieci poniżej 1 roku życia. Przed podaniem preparatu dzieciom w tej

gronie wiekowej, należy skonsultować się z lekarzem.
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat:
Dwa razy dziennie po 10 ml junior-angin syropu dla dzieci

Regularne przyjmowanie preparatu

Regularne i zgodne z zaleceniami stosowanie junior-angin syrop dla dzieci ma decydujące znaczenie dla powodzenia kuracji. Dla podtrzymania efektów zaleca się kontynuowanie stosowania junior-angin syrop dla dzieci przez kolejne 2-3 dni po ustąpieniu objawów.

Czas stosowania

W razie potrzeby junior-angin syrop dla dzieci może być stosowany przez dłuższy czas. Jeżeli po jednym tygodniu stosowania dolegliwości utrzymują się lub wręcz nasilają, należy skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Termin ważności tego produktu zamieszczony jest na opakowaniu tekturowym oraz na etykiecie butelki. Nie stosować produktu po upływie podanego terminu ważności.

Po otwarciu spożyć produkt w ciągu 14 dni.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

- * Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.
- * Posiada deklarację zgodności UE
- * Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- * Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.