

Krople walerianowe 35



cena: 3,63 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	układ nerwowy
Działanie	uspokajające
Opakowanie	35 g
Postać	płyn
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Valeriana officinalis
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	bezsenność, stres

Opis produktu

Opis:

Produkt leczniczy Krople walerianowe o łagodnym działaniu uspokajającym, stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego i jako środek ułatwiający zasypianie.

Skład:

1 ml (0,9 g) zawiera:

1 ml nalewki z korzenia kozłka (Valerianae tinctura) (DER 1:4,5-5).

Ekstrahent: etanol 70% (v/v).

Lek zawiera 63-69% v/v etanolu.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież do 12 lat:

w stanach napięcia nerwowego - 2 do 3 ml płynu 3 razy na dobę

w trudnościach z zasypianiem - pojedynczą dawkę 2-3 ml płynu podać na 1 do 1/2 godziny przed zasnięciem, w razie konieczności zaleca się wcześniejsze zastosowanie dawki dodatkowej.

Nie należy przekraczać 4 dawek leku na dobę (4 razy 2-3 ml).

Zaleca się przyjmowanie odmierzonej dawki leku wraz z niewielką ilością płynu (np. w 1/4 szklance wody).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, bóle brzucha).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u pacjentów z chorobami wątroby i padaczką.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią:

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży oraz u karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Ze względu na zawartość alkoholu lek może upośledzać obsługę urządzeń mechanicznych i zdolność prowadzenia pojazdów.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.