

Levosol syrop 6 mg/ml 120 ml

cena: 20,96 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe
Działanie	przeciwkaszlowe
Opakowanie	120 ml
Postać	syrop
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Levodropropizynium
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	kaszel suchy

Opis produktu

Opis:
Lek LEVOSOL zawiera substancję czynną – lewodropropizynę o działaniu przeciwkaszlowym i znoszącym skurcz oskrzeli. LEVOSOL wskazany jest w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu.

Skład:
Substancją czynną leku jest lewodropropizyna. 1 ml syropu zawiera 6 mg lewodropropizyny.

Pozostałe składniki to: sorbitol (E420), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), lewomentol; aromat malinowy AR0616 składniki aromatyczne, glikol propylenowy (E1520), aromat malinowy AR2103 składniki aromatyczne, triacetyna (E1518), glicerol, sukraloza (E955), kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Wskazania:
LEVOSOL wskazany jest w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu.

Wiele danych wskazuje, że lek ten skutecznie hamuje kaszel o różnym pochodzeniu, jak np. kaszel w przebiegu raka płuca, kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych czy krztusiec.

Przeciwwskazania:
Leku LEVOSOL nie należy stosować:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

u osób z obfitym wydzielina oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek),
u kobiet w ciąży i karmiących piersią,
u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 28 dni. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.