

Maalox 20 tabletek

cena: 10,20 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	przełyk, żołądek
Działanie	zobojętniające
Opakowanie	20 tabl. (2 blist. po 10 tabl.)
Postać	tabletki
Producent	OPELLA HEALTHCARE POLAND SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Alumini hydroxydum, Magnesii hydroxidum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	nadkwaśność, refluks, wrzody, zgaga

Opis produktu

Opis:

Maalox to produkt leczniczy do stosowania w leczeniu objawowym nadkwaśności, zgadze, nieżycie żołądka.

Skład:

Substancjami czynnymi są: wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu.

1 tabletki zawiera 400 mg wodorotlenku glinu, 400 mg wodorotlenku magnezu.

Substancje pomocnicze: mannitol, sorbitol, sacharyna sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, sacharoza zawierająca 3% skrobi, sacharoza.

1 tabletki zawiera 150 mg sacharozy.

Działanie:

Maalox posiada działanie zobojętniające, ściągające, osłaniające błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Maalox nie wpływa bezpośrednio na wydzielanie kwasu solnego w żołądku, obniża stężenie kwasu w świetle przełyku.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

1-2 tabletki należy ssać lub żuć po posiłku lub w czasie bólu.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Maalox:

w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne oraz inne substancje pomocnicze w leku, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy zachować ostrożność w stosowaniu Maaloxu u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie, u dzieci poniżej 6 lat (stosować jedynie po konsultacji z lekarzem), u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie produktu u małych dzieci może prowadzić do hipermagnezemii.

Produktu nie należy stosować długotrwale.

Maalox zawiera sacharozę (wskazówka dla chorych na cukrzycę) oraz sorbitol (nie stosować u pacjentów, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów).

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Maalox należy zażywać nie wcześniej niż 2 godziny po zażyciu innego leku (w przypadku fluorochinolonów - ponad 4 godziny) lub 1-2 godziny przed przyjęciem innego leku.

Maalox może wchodzić w interakcje z:

fluorochinolonami, tetracyklinami, linkozamidami,

lekami blokującymi receptor H₂,

atenololem, propranololem,

digoksyną,

ketokonazolem,

glikokortykosteroidami,

lewotyroksyną,

rosuwastatyną,

salicylanami,

solami żelaza

Stosowanie leku z jedzeniem i pićciem:

Lek stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią:

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.