



cena: 20,48 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	przełyk, żołądek
Działanie	zobojętniające
Opakowanie	250 ml
Postać	zawiesina
Producent	OPELLA HEALTHCARE POLAND SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Alumini hydroxydum, Magnesium hydroxydum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	nadkwaśność, refluks, wrzody, zgaga

Opis produktu

Opis:

Maalox to produkt leczniczy do stosowania w objawowym leczeniu dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego związanych z nadkwaśnością.

Skład:

Substancjami czynnymi są: wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu.

100 ml zawiesiny zawiera 3,5 g glinu wodorotlenku i 4,0 g magnezu wodorotlenku.

Substancje czynne: kwas solny rozcieńczony, kwas cytrynowy bezwodny, olejek miętowy, mannitol, bromek domifenu, sacharyna sodowa, sorbitol 70%, nadtlenek wodoru 30%, woda oczyszczona.

Wskazania:

Maalox wskazany jest w objawowym leczeniu zaburzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego z nadkwaśnością, takich jak: nieżyt żołądka, zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku (w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony), niestrawność, zgaga z powodu nadkwaśności, choroba wrzodowa dwunastnicy i/lub żołądka (pomocniczo).

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Produkt do stosowania doustnego, przed użyciem wstrząsnąć.

1 łyżka stołowa (10 ml) 90 minut po posiłku lub w czasie bólu.

Dawka maksymalna - 140 ml zawiesiny na dobę.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Maalox:
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu,
w ciężkiej niewydolności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Lek zawiera sorbitol - nie stosować w przypadku stwierdzenia nietolerancji niektórych cukrów.
Należy zachować ostrożność stosując lek w przypadku: niewydolności nerek lub pacjentów poddawanych hemodializie, u dzieci poniżej 6 lat, u pacjentów w podeszłym wieku.
Stosowanie leku u małych dzieci może wiązać się z hipermagnezemią (szczególnie przy zaburzonej czynności nerek).
Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Maalox należy zażywać nie wcześniej niż 2 godziny po zażyciu innego leku (w przypadku fluorochinolonów - ponad 4 godziny) lub 1-2 godziny przed przyjęciem innego leku.

Maalox może wchodzić w interakcje z:
fluorochinolonami, tetracyklinami, linkozamidami,
lekami blokującymi receptor H₂,
atenololem, propranololem,
digoksyną,
ketokonazolem,
glikokortykosteroidami,
lewotyroksyną,
rosuwastatyną,
salicylanami.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićm:

Lek należy stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią:

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.