

Mentho Paraffinol Hasco 125g



cena: 8,43 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	jelita
Działanie	przeczyszczające
Opakowanie	125 g
Postać	roztwór
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Paraffinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	zaparcia

Opis produktu

Opis:

Mentho-Paraffinol to lek o działaniu przeczyszczającym. Produkt leczniczy ma postać płynu doustnego i stosuje się go w zaparciach. Działanie płynu Mentho-Paraffinol polega na hamowaniu wchłaniania wody oraz powlekanii błony śluzowej jelit, co powoduje rozmięczenie mas kałowych i ułatwia wypróżnianie.

Skład:

Substancją czynną leku jest parafina ciekła (Paraffinum liquidum).
1 g roztworu doustnego zawiera 998,75 mg parafiny ciekłej (Paraffinum liquidum).
Substancje pomocnicze: Olejek mięty pieprzowej.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie.

Dawkowanie płynu Mento-Paraffinol to 1-3 łyżki stołowe (15-45ml) na noc, choć nie bezpośrednio przed snem, lub rano na czczo. Działanie występuje po kilku godzinach od zastosowania leku.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i krwawienia z odbytnicy, zaburzenia w połykaniu, kolostomia lub ileostomia, zapalenie uchyłków, nudności i wymioty.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić w wyniku przewlekłego stosowania parafiny ciekłej jako środka przeczyszczającego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1 do 2 dni należy skontaktować się z lekarzem.

Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie produktu może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia.

U dzieci i osób w podeszłym wieku należy ograniczyć stosowanie produktu do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek przez możliwie najkrótszy okres.

Po pierwszym otwarciu lek można stosować przez 3 miesiące.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Produkt może zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tj. A, D, E i K oraz równocześnie stosowanych leków doustnych.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

U dzieci należy ograniczyć stosowanie produktu do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek przez możliwie najkrótszy okres. Decyzję o stosowaniu leku podejmuje lekarz.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.