

MIG 400 mg 20 tabletek



cena: 9,80 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	głowa, mięśnie, plecy, stawy, zęby
Działanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne
Opakowanie	20 sztuk
Postać	tabletki
Producent	BERLIN-CHEMIE AG
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Ibuprofenum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	ból, stan zapalny

Opis produktu

Opis:

MIG to produkt leczniczy do stosowania w gorączce, bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu.

Skład:

Substancją czynną jest: ibuprofen (Ibuprofenum).

1 tabletki zawiera 400 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza 6 mPas, makrogl 4000, powidon K 30, tytanu dwutlenek (E 171).

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Kolejne dawki należy przyjmować nie częściej niż co 6 godzin.

Lek stosować w trakcie lub po posiłku.

Lek stosować z odpowiednią ilością wody.

Tabletkę można dzielić na równe dawki.

Lek do stosowania krótkotrwałego - nie dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki, nie dłużej niż 4 dni w przypadku bólu.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku MIG:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

jeśli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje alergiczne po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takie jak: skurcz oskrzeli, napady astmy, obrzęk błony śluzowej nosa, reakcje skórne, w niespecyficznym zaburzeniach krwiotworzenia, w czynnej lub nawracającej w wywiadzie chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzodach trawiennych) lub krwawieniach z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne przypadki stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), w przypadku perforacji lub krwawień z przewodu pokarmowego, związanych z wcześniejszym leczeniem NLPZ, jeśli u pacjenta występuje krwawienie mózgowe (krwawienia mózgowo-naczyniowe) lub inne czynne krwawienie, w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, w ciężkiej niewydolności serca, u kobiet w 3 ostatnich miesiącach ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy unikać stosowania leku MIG z innymi lekami z grupy NLPZ.

U osób w podeszłym wieku częstość występowania niektórych działań niepożądanych jest inna.

Ryzyko choroby wrzodowej, krwawienia z przewodu pokarmowego zwiększa się wraz z zażywaną dawką.

Ibuprofen zawarty w leku posiada również działanie przeciwzakrzepowe (hamuje czasowo czynność płytek krwi). Zachować ostrożność stosując u osób z zaburzeniami krzepnięcia.

Nie należy stosować leku z ospie wietrznej.

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzeń nerek, niewydolności nerek.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.