


# Mucopect Kids syrop 50g/ml 200ml



cena: 18,18 pln

## Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe, oskrzela, płuca
Działanie	wykrztuśne
Opakowanie	200 ml
Postać	syrop
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Carbocisteinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	kaszel, kaszel mokry

## Opis produktu

### Opis:

Mucopect Kids to syrop o smaku agrestowym. Przeznaczony jest dla dzieci od 6 roku życia i dorosłych w leczeniu kaszlu z utrudnionym odkrztuszaniem gęstej, lepkiej wydzieliny.

### Skład:

Substancja czynną jest karbocysteina (Carbocysteinum).

1 ml produktu leczniczego Mucopect Kids zawiera 50 mg karbocysteiny.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), karmel (E 150d), sacharoza, aromat agrestowy „Aroma grosella 63 2334” glikol propylenowy, mrówczan etylu, octan izopentyli, 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one, 3-metylobutan-1-ol, gruszlina karbolistny (Barosma betulina), ekstrakt, kwas octowy, 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

### Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu trzy razy na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: początkowo 15 ml trzy razy na dobę, po osiągnięciu zadowalającej odpowiedzi na leczenie 10 ml trzy razy na dobę.

Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.

Syrop należy odmierzać przy użyciu dołączonej miarki.

### Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz u

pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Nie należy stosować produktu przed snem. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem.

Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą i skurczem oskrzeli w wywiadzie, z przebytą chorobą wrzodową, z ostrą niewydolnością oddechową, z osłabionym odruchem kaszlu.

Produkt zawiera sacharozę oraz metylu parahydroksybenzoesan.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące. Nie stosować tego leku, jeśli syrop zmienił barwę lub wykazuje jakiegokolwiek inne oznaki zepsucia.

**Stosowanie innych leków:**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

W trakcie leczenia karbocysteina nie należy stosować leków przeciwkaszlowych ani leków zmniejszających wydzielanie śluzu oskrzelowego.

**Ciąża i karmienie piersią:**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

**Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:**

Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.