

Nurofen Mięśnie i Stawy (Nurofen) żel 50mg



cena: 22,29 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	mięśnie, stawy
Działanie	przeciwbólowe, przeciwzapalne
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Sposób aplikacji	na skórę
Substancja czynna/dawka	Ibuprofenum
Wskazania	ból, nerwoból, stłuczenie, urazy, zapalenie, zwichnięcie

Opis produktu

Opis:

Żel o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym, przeznaczony do szybkiego leczenia objawowego bólów mięśniowych, bólów pleców, bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, takim jak lekkie postaci zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe, fibromialgia i nerwobóle.

Skład:

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu (Ibuprofenum)

Stosowanie:

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Należy wycisnąć od 4 do 10 cm żelu (ilość odpowiadająca około 50 do 125 mg ibuprofenu) i delikatnie wsmarować w miejsce objęte dolegliwościami, aż do całkowitego wchłonięcia.

Produktu leczniczego nie należy stosować częściej niż co 4 godziny i nie więcej niż 4 razy na dobę.

Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu produktu leczniczego należy umyć ręce.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Jeśli po upływie 2 tygodni stosowania produktu objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, należy zasięgnąć opinii lekarza.

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczne specjalne dostosowanie dawki.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Brak wskazań do stosowania produktu leczniczego Nurofen Mięśnie i Stawy w postaci żelu u dzieci. Niewskazane jest stosowanie



produktu leczniczego bez zalecenia lekarza.

Sposób podawania:

Do miejscowego stosowania na skórze. Wyłącznie do stosowania krótkotrwałego.
Nie wolno stosować dłużej niż 14 dni bez zalecenia lekarza.

Dodatkowe informacje:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.