

## Otrivin Menthol aerozol do nosa 10 ml



cena: 27,07 pln

### Opis słownikowy

Cześć ciała	nos
Działanie	łagodzące, odświeżające, udrażniające nos
Opakowanie	10ml
Postać	aerozol do nosa, roztwór
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	do nosa
Substancja czynna/dawka	Xylometazolini hydrochloridum
Wskazania	katar

### Opis produktu

#### Opis:

Otrivin Menthol zawiera naturalny mentol, który pozostawia uczucie orzeźwienia na błonie śluzowej nosa. Zaczyna udrażniać nos już w 2 minuty po podaniu. Nie zawiera konserwantów - szczególnie zalecany pacjentom z wrażliwą błoną śluzową nosa, narażoną na wysychanie.

Otrivin Menthol jest lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatłoczony nos ułatwiając oddychanie. Otrivin Menthol to połączenie substancji leczniczej, ksylometazoliny, z naturalnym mentolem, który dzięki swoim właściwościom jest wykorzystywany w leczeniu górnych dróg oddechowych. Substancje pomocnicze zastosowane w Otrivinie Menthol, czyli mentol i eukaliptol, wywołują po zastosowaniu uczucie chłodu na błonie śluzowej nosa. Produkt jest więc skierowany do pacjentów, którzy nie tylko szukają rozwiązania na zatłoczony nos, ale także lubią mentolowe orzeźwienie.

#### Skład:

Jeden ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodoru ksylometazoliny (Xylometazolini hydrochloridum)

#### Stosowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

1 dawka aerozolu Otrivin Menthol do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Sposób aplikacji Otrivin Menthol:

Oczyścić nos.

Butelkę należy trzymać pionowo, kciukiem podtrzymując dno butelki, końcówkę umieścić między dwoma palcami.

Pochylić głowę do przodu i umieścić końcówkę w otworze nosowym.  
Nacisnąć pompkę i jednocześnie wciągnąć nosem powietrze.  
Powtórzyć czynności podczas podawania leku do drugiego otworu nosowego.  
Po użyciu oczyścić i osuszyć końcówkę dozownika oraz nałożyć nasadkę ochronną.  
Zaleca się, aby ostatnią dawkę produktu przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać.  
Otrivin Menthol nie powinien być stosowany dłużej niż przez 10 kolejnych dni.  
Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.