


Pectosol koncentrat do sporządzania roztworu doustnego 40 g



cena: 9,05 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe
Działanie	wspomagające, wykrztuśne
Opakowanie	40 g
Postać	koncentrat
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	infekcja, kaszel mokry, zapalenie

Opis produktu

Opis:

Pectosol jest tradycyjnym lekiem roślinnym ułatwiającym odkrztuszanie zalegającej wydzieliny w przebiegu przeziębienia. Zawiera etanolowo-wodny wyciąg z: ziela tymianku, porostu islandzkiego, ziela hyzopu i korzenia mydlnicy. Jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Wskazania do stosowania

Tradycyjny lek roślinny stosowany w:

- stanach zapalnych górnych dróg oddechowych,
- utrudnionym odkrztuszaniu z zalegającą wydzieliną.

Wymienione wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

Skład:

100 g leku zawiera 90 g płynnego wyciągu (1:3) z: *Thymus vulgaris* L. lub *Thymus zygis* L., herba (ziele tymianku) / *Cetraria islandica* (L.) *Acharius* s.l., thallus (porost islandzki) / *Hyssopus officinalis* L., herba (ziele hyzopu) / *Saponaria officinalis* L., radix (korzeń mydlnicy) (18/7/3/2).

Ekstrahent: etanol 70% (V/V).

- Pozostały składnik to: glicerol.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy na dobę pić po 1 łyżeczce leku Pectosol (ok. 5 ml) rozcieńczonego w ½ szklanki (ok. 125 ml) wody.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 1 tydzień, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat z powodu braku danych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pectosol

Brak danych na temat przedawkowania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pectosol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli wystąpią duszności, gorączka lub ropna płwocina należy skontaktować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat z powodu braku danych.

Pectosol a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceutce o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie odnotowano przypadków interakcji leku Pectosol z innymi lekami.

Pectosol z jedzeniem, pić i alkoholem:

Dotychczas nie odnotowano wpływu jedzenia, picia i alkoholu na działanie leku Pectosol.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Ilość alkoholu w tym leku może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, gdyż może on wpływać na ocenę sytuacji i szybkość reakcji. Nie zaleca się stosowania leku przed podróżą oraz w jej trakcie, ponieważ alkohol zawarty w leku może być wykryty w powietrzu wydychanym.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.