

Pelavo Med tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej na przeziębienie 20 sztuk

cena: 21,38 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe, układ odpornościowy
Działanie	wspomagające, wzmacniające
Opakowanie	20 sztuk
Postać	tabletki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Pelargonium sidoides
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	osłabienie odporności, przeziębienie

Opis produktu

Opis:

Pelavo Med jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w objawowym leczeniu przeziębienia. Pelavo Med jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Skład:

Jedna tabletki zawiera 20 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt., radix (korzeń pelargonii) – Pelargonii radicis extractum siccum (4-25:1); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11% (m/m).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

glukoza (składnik maltodekstryny), dwutlenek siarki E 220 (składnik aromatów). Jedna tabletki zawiera 0,000032 mg dwutlenku siarki oraz do 2 mg glukozy.

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat 3 x 1 tabletki rano, w południe, wieczorem

Dzieci w wieku 6 - 12 lat 1 tabletki 2 x 1 tabletki rano i wieczorem

Stosować doustnie. Tabletkę należy umieścić na języku, poczekać aż się rozpuści i połknąć ze śliną. Tabletki można przyjmować bez popicia.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną (wyciąg z korzenia pelargonii), na inne gatunki pelargonii oraz na inne rośliny z rodziny Geraniaceae lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.