

## Polcrom 2% aerozol do nosa 20 mg/1ml 15 ml



cena: 20,45 pln

### Opis słownikowy

Cześć ciała	nos
Działanie	przeciwalergiczne, udrażniające nos
Opakowanie	15 ml
Postać	aerozol
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S.A.
Sposób aplikacji	do nosa
Substancja czynna/dawka	Acidum cromoglicicum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	alergia, katar

### Opis produktu

#### Opis:

Polcrom to produkt leczniczy do stosowania w okresie sezonowego i całorocznego alergicznego nieżyty nosa.

#### Skład:

Substancją czynną jest: sodu kromoglikan.

1 ml roztworu zawiera 20 mg sodu kromoglikanu. 1 dawka z kolei 2,8 mg sodu kromoglikanu.

Substancje pomocnicze: sorbitol, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbitat 80, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

#### Działanie:

Polcrom to lek przeciwalergiczny, zawierającym sodu kromoglikan, który hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych.

#### Wskazania:

Leczenie zapobiegawcze w sezonowym i całorocznym alergicznym nieżycie nosa.

#### Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do użytku zewnętrznego, miejscowo do nosa.

Stosowanie leku należy rozpocząć co najmniej tydzień przed narażeniem na kontakt z alergenem i kontynuować przez cały okres narażenia na alergen.

Lek powinien być stosowany wyłącznie przez 1 osobę ze względów higienicznych.

Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik 3-5 krotnie, aż do pojawienia się mgiełki leku.

Dorośli i młodzież, dzieci od 3 roku życia: 1 dawka do każdego otworu nosowego, 4-6 razy na dobę.

**Przeciwwskazania:**

Kiedy nie stosować leku Polcrom:

w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na sodu kromoglikan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

podrażnienie błony śluzowej nosa,

przekrwienie i obrzęk błony śluzowej,

kichanie, krwawienia z nosa,

świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej,

kaszel, zaburzenia smaku, ból głowy, wysypka,

reakcje nadwrażliwości.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Polcrom zawiera chlorek benzalkoniowy, który może wywoływać działania niepożądane. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.