

Procto-Glyvenol czopki 10 sztuk



cena: 26,12 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	odbyt
Działanie	przeciwobrzękowe, przeciwzapalne, wspomagające, wzmacniające, znieczulające
Opakowanie	10 czop. (2 blist. po 5 szt.)
Postać	czopki doodbytnicze
Producent	RECORDATI IRELAND LTD
Sposób aplikacji	doodbytnicze
Substancja czynna/dawka	Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum
Wskazania	ból, hemoroidy, obrzęk, stan zapalny, świąd

Opis produktu

Opis

Procto-Glyvenol - produkt leczniczy w postaci czopków doodbytniczych.

Skład

Substancjami czynnymi leku są tribenozyd (Tribenosidum) i lidokaina (Lidocainum).

1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy.

Substancje pomocnicze: tłuszcz (Witepsol E85), tłuszcz (Witepsol W35).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

Podanie doodbytnicze.

Zalecana dawka to 1 czopek rano oraz 1 czopek wieczorem - aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć, stosując 1 czopek raz na dobę.

Jeśli po upływie 7 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pojawiły się inne, nieobserwowane wcześniej objawy, należy zwrócić się do lekarza, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości.

Działanie

Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo, a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego.

Lidokaina jest substancją miejscowo znieczulającą i łagodzi dolegliwości spowodowane żylakami odbytu.

Wskazania

Lek Procto-Glyvenol stosowany jest w miejscowym leczeniu zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Procto-Glyvenol:

jeśli pacjent ma uczulenie na tribenozyd, lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób):

pokrzywka,
świąd w miejscu podania,
wysypka w miejscu podania,
ból w miejscu podania.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób):

reakcja anafilaktyczna,
zaburzenia sercowo-naczyniowe,
skurcz oskrzeli,
obrzęk naczynioruchowy,
obrzęk twarzy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Procto-Glyvenol należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby.

W uzupełnieniu leczenia hemoroidów lekiem Procto-Glyvenol, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca.

Nie wolno stosować leku doustnie.

Należy unikać kontaktu z oczami.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Procto-Glyvenol nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży. Może być stosowany od 4 miesiąca ciąży oraz w okresie karmienia piersią, pod warunkiem nieprzekraczania zalecanych dawek.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować tego leku u dzieci, ponieważ nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.

Producent

RECORDATI IRELAND LTD

Raheens East

Ringaskiddy, Co. Cork, Irlandia