

Radirex MAX 10 kapsułek



cena: 10,04 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------------------|--|
| Cześć ciała | jelita |
| Działanie | przeczyszczające, wspomagające |
| Opakowanie | 10 sztuk |
| Postać | kapsułki |
| Producent | WROCLAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A. |
| Sposób aplikacji | doustnie |
| Substancja czynna/dawka | Rheum officinale |
| Typ produktu | Lek bez recepty |
| Wskazania | zaparcia |

Opis produktu

Opis:

Radirex MAX jest roślinnym produktem leczniczym do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach. Maksymalna moc w walce z zaparciami. Działa silnie ale nie gwałtownie.

Proste dawkowanie dzięki zastosowaniu maksymalnej, leczniczej dawki substancji czynnej. Nowoczesna forma łatwej do połknięcia kapsułki.

Skład:

1 kapsułka twarda zawiera 196,9 mg – 371,2 mg wyciągu suchego z korzenia rzewienia (Rheum palmatum L. i/lub Rheum officinale Baillon, radix), co odpowiada 15 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 3,8 mg – 178,1 mg.

Sposób użycia:

Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

2 kapsułki Radirex MAX na dobę, wieczorem.

Pacjenci, u których działanie jest zbyt silne, mogą obniżyć dawkę i stosować 1 kapsułkę na dobę, wieczorem.

Najodpowiedniejszą dawką jednorazową jest najniższa dawka potrzebna do uzyskania miękkiego stolca.

Działanie przeczyszczające następuje po 8 – 12 godzinach.

Stosowanie leku dłużej niż dwa tygodnie wymaga konsultacji z lekarzem.

Maksymalną dawką dobową jest 30 mg glikozydów hydroksyantracenowych.

Odpowiada to dwóm kapsułkom Radirex MAX.

Zazwyczaj wystarcza stosowanie leku od dwóch do trzech razy w tygodniu.
Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci poniżej 12 lat: nie stosować.

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, Radirex MAX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania:
częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania produktu leczniczego Radirex MAX mogą wystąpić:

Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości – częstość nieznana.

Zaburzenia żołądka i jelit: Ból brzucha, stany skurczowe jelit, płynny stolec (szczególnie u pacjentów z nadwrażliwym jelitem grubym) – częstość nieznana.

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, białkomoczu i krwiomoczu.

Długotrwałe stosowanie leku może powodować pigmentację śluzówki jelita (pseudomelanosis coli), która zwykle przemija po zakończeniu stosowania leku.

Podczas leczenia może wystąpić żółte lub czerwono-brązowe (zależnie od odczynu pH) zabarwienie moczu spowodowane obecnością w nim metabolitów substancji czynnych, co nie jest istotne klinicznie.

Jeśli wystąpią inne, nieopisane powyżej działania niepożądane należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie:

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.