

## Ranigast Famotydyne 0,02g 20 tabletek

cena: 17,06 pln



### Opis słownikowy

Cześć ciała	jelita, układ pokarmowy, żołądek
Działanie	wspomagające
Opakowanie	20 sztuk
Postać	tabletki
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Famotidinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	nadkwaśność, niestrawność, zgaga

### Opis produktu

#### Opis:

Tabletki powlekane Famotydyne Ranigast to lek zmniejszający wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Famotydyne Ranigast stosuje się w zgadze, nadkwaśności czy niestrawności. Zawarta w leku famotodynyne należy do grupy antagonistów receptora H2 i działa do 12 godzin.

#### Skład:

Substancją czynną leku jest famotydyne.

1 tabletkę powlekaną zawiera 20 mg famotodyny.

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: skrobia żelowana, celuloza sproszkowana, magnezu stearynian, talk. Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, talk, lak z czerwieńią koszenilową (E124).

#### Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletkę należy połykać w całości i popijać wodą. Zwykle stosowane dawkowanie Famotodyny Ranigast u dorosłych to 1 tabletkę przy pojawieniu się objawów. ewentualnie drugą tabletkę można przyjąć, jeśli dolegliwości pojawią się ponownie. Maksymalna dawka dobową leku to 2 tabletki.

Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem przez dłużej niż 2 tygodnie. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

#### Działanie:

Famotydyne Ranigast zawiera substancję czynną z grupy antagonistów receptora H2, której działanie polega na zmniejszaniu ilości



wydzielanego w żołądku kwasu solnego. Efekt terapeutyczny leku utrzymuje się przez 10 do 12 godzin.

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować tabletek Famotydyna Ranigast u osób uczulonych na famotydynę czy inne leki z grupy antagonistów receptorów H2 lub którykolwiek z pozostałych składników tego produktu leczniczego. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest niewydolność nerek.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.