

Silimax 70 mg 36 kapsułek



cena: 5,00 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	wątroba
Działanie	żółciopędne, żółciotwórcze
Opakowanie	36 sztuk
Postać	kapsułki
Producent	FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARM
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Silymarin

Opis produktu

Opis

SILIMAX jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym tradycyjnie. Jego skuteczność, w wymienionych wskazaniach, opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Skład

Substancją czynną leku jest sylimaryna
1 kapsułka zawiera 70 mg sylimaryny.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, żelatyna hydrolizowana, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), dwutlenek tytanu (E 171).

Dawkowanie

SILIMAX należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 kapsułka trzy razy na dobę (210 mg sylimaryny na dobę).

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej lek należy przyjmować po posiłku popijając wodą.

SILIMAX jest skuteczny w przypadku systematycznego stosowania. Okres stosowania leku należy skonsultować z lekarzem. Leczenie powinno trwać 4 tygodnie, a w stanach przewlekłych do 6 miesięcy.

Działanie

Substancją czynną leku jest sylimaryna - wyciąg z owocu ostropestu, który zawiera pochodne flawonolu (sylimbinę, sylidiaminę i sylikrystynę).

Wskazania

Tradycyjnie w stanach po uszkodzeniach wątroby spowodowanych czynnikami toksycznymi np. alkoholem, środkami ochrony roślin, po spożyciu trudno strawnych pokarmów, a także po uszkodzeniach spowodowanych działaniem leków.

Wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować leku SILIMAX:

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu lub na rośliny z rodziny Compositae.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, SILIMAX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Zaburzenia żołądka i jelit: podczas stosowania dużych dawek leku może wystąpić słabe działanie przeczyszczające.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Producent

FILOFARM

Kazimierza Pułaskiego 39

Bydgoszcz