

Sinecod krople 5 mg/ml 20 ml



cena: 21,60 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe, krtań, oskrzela, płuca
Działanie	przeciwkaszlowe
Opakowanie	20 ml
Postać	krople
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Butamiratum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	kaszel, kaszel suchy

Opis produktu

Opis:

Krople doustne Sinecod to lek przeciwkaszlowy. Krople zawierają butamirat, który stosuje się w objawowym leczeniu kaszlu różnego pochodzenia. Lek jest przeznaczony do podawania dzieciom.

Skład:

Substancją czynną leku Sinecod jest butamiratu cytrynian (Butamirati citras).

1 ml roztworu (22 krople) zawiera 5 mg butamiratu cytrynianu.

Substancje pomocnicze: sorbitol 70% roztwór, sacharyna sodowa, wanilina, kwas benzoesowy, etanol 96% v/v, glicerol, sodu wodorotlenek 30% roztwór w/w, woda oczyszczona.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie, nie dłużej niż 5 do 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat krople można podawać wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Zwykle stosowane dawkowanie leku zależy od wieku pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku, gdy kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na działanie przeciwkaszlowe kropli, nie należy łączyć go z lekami wykrztuśnymi.

Lek zawiera sorbitol oraz alkohol. Z tego powodu przed zastosowaniem kropli u pacjentów z nietolerancją niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w temperaturze do 25°C.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Sinecod może wchodzić w interakcje z lekami wykrztuśnymi.

Ciąża i karmienie piersią:

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 2. miesiąca życia. U dzieci w wieku od 2 miesiąca życia do 2 lat można stosować krople Sinecod tylko na zalecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Sinecod może powodować senność.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.