

Sinecod syrop 100 ml



cena: 26,28 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe
Działanie	przeciwkaszlowe
Opakowanie	100 ml (but.)
Postać	syrop
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Butamiratum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	kaszel

Opis produktu

Opis:

Sinecod to produkt leczniczy o działaniu przeciwkaszlowym do stosowania w leczeniu objawowym kaszlu różnego pochodzenia.

Skład:

Substancją czynną jest: butamirat (w postaci cytrynianu) (Butamirati citras).

1 ml syropu zawiera 1,5 mg cytrynianu butamiratu.

Substancje pomocnicze: sorbitol 70% roztwór, sacharyna sodowa, wanilina, kwas benzoesowy, etanol 96% v/v, glicerol, sodu wodorotlenek 30% roztwór w/w, woda oczyszczona.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Nie stosować dłużej niż 5-7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Do opakowania dołączona jest miarka.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Sinecod:

w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

senność,
nudności,
biegunka,
pokrzywka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie stosować leku dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Nie stosować leku u dzieci poniżej 3 lat.

Lek zawiera w swoim składzie sorbitol - nie stosować w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.

Lek zawiera etanol (alkohol).

Lek należy przechowywać w temperaturze do 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przelewać leku z miarki z powrotem do butelki.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.