

## Steper PRO krem 0,01 g/g 15 g (tuba)

cena: 17,36 pln



### Opis słownikowy

Cześć ciała	dłonie, stopy
Działanie	ochronne, przeciwgrzybicze, wspomagające
Opakowanie	15 g (tuba)
Postać	krem
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	na skórę
Substancja czynna/dawka	Bifonazolum
Wskazania	grzybica

### Opis produktu

#### Opis:

STEPPER PRO w postaci kremu do stóp to produkt leczniczy zawierający substancję czynną bifonazol, o szerokim zakresie działania przeciwgrzybicznego. Przeznaczony jest dla osób narażonych na częsty kontakt z grzybami i bakteriami, szczególnie osób aktywnie uprawiających sport bądź często korzystających z miejsc publicznych, takich jak basen, sauna czy siłownia.

#### Skład:

Substancja czynna  
1 g kremu zawiera 10 mg bifonazolu (Bifonazolum)

#### Wskazania:

Steper Pro należy stosować w miejscowym leczeniu zakażeń grzybiczych skóry, wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów, jak, np.: grzybica dłoni i stóp, grzybica tułowia, grzybica fałdów skórnych, łupież pstry, kandydozy powierzchniowe. Do stosowania również w miejscowym leczeniu łupieżu rumieniowatego.

#### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

#### Sposób użycia

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### Zalecana dawka

Lek należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem, przed snem. Niewielka ilość leku jest zazwyczaj wystarczająca do pokrycia skóry ze zmianami chorobowymi wielkości dłoni.

**Sposób stosowania:**

Należy nanieść cieką warstwę leku na obszar objęty zmianami chorobowymi i delikatnie wmasować.

**Czas trwania leczenia**

Leczenie lekiem Steper PRO należy prowadzić przez odpowiednio długi okres. Lek zwykle stosuje się jak przedstawiono w poniższej tabeli.

**Wskazanie - okres leczenia**

Grzybice stóp, w tym grzybica międzypalcowa 3 tygodnie

Grzybica tułowia, dłoni i fałdów skórnych 2 – 3 tygodnie

Łupież pstry 2 tygodnie

Łupież rumieniowaty 2 tygodnie

Grzybica (kandydoza) powierzchniowa skóry 2 – 4 tygodnie

**Stosowanie u dzieci\***

U niemowląt i małych dzieci lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

**Podmiot odpowiedzialny:**

Aflfarm Farmacja Polska Spółka z o.o.